

Respuestas a preguntas frecuentes sobre BLENREP



Este folleto puede ayudarle en su tratamiento con BLENREP. Contiene respuestas a las preguntas más frecuentes sobre BLENREP. Si tiene más preguntas, hable con su oncólogo y su equipo de atención médica; ellos están ahí para usted.

Uso aprobado

BLENREP es un medicamento de venta con receta que se utiliza en combinación con los medicamentos bortezomib y dexametasona para tratar a adultos con mieloma múltiple que:

- han recibido al menos 2 tratamientos previos, incluido un inhibidor del proteasoma y un agente inmunomodulador, y
- su cáncer ha reaparecido o no ha respondido a un tratamiento previo

Se desconoce si BLENREP es seguro y eficaz en niños.

Información importante de seguridad

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre BLENREP?

BLENREP puede ocasionar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Problemas oculares.** Los problemas oculares son frecuentes con BLENREP y también pueden ser graves. BLENREP puede causar cambios en la superficie del ojo, lo que puede provocar síntomas de problemas oculares, como:

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| - disminución de la visión | - sequedad ocular | - sentir que hay algo en sus ojos | - irritación ocular |
| - visión borrosa | - sensibilidad a la luz | | - dolor ocular |

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento. Haga clic para ver la [Información de prescripción completa](#), incluido el [Recuadro de advertencias](#) y la [Guía del medicamento de BLENREP](#).



BLENREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

PREGUNTAS FRECUENTES

ACERCA DEL MIELOMA MÚLTIPLE

¿Cuáles son algunos datos clave sobre el mieloma múltiple?

El mieloma múltiple es la segunda forma más frecuente de cáncer de la sangre. Este tipo de cáncer es incurable, pero se puede tratar. Es frecuente que las personas con mieloma múltiple tengan periodos de remisión. Además, el mieloma múltiple de algunas personas ya no responde al tratamiento o su cáncer avanza.

Información importante de seguridad de BLENREP (cont.)

También pueden aparecer úlceras en la superficie del ojo (úlceras corneales), incluidas las infecciones, durante el tratamiento con BLENREP.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si nota algún síntoma ocular nuevo o que empeora durante el tratamiento con BLENREP.

Su proveedor de atención médica lo derivará a un especialista en oftalmología (como un oftalmólogo o un optometrista) para que le examine los ojos antes de iniciar el tratamiento, antes de recibir cada dosis de BLENREP y según sea necesario para detectar cualquier problema ocular nuevo o que empeore. **Es importante que usted:**

- Acuda a todas sus citas de oftalmología porque pueden producirse algunos cambios sin síntomas y es posible que solo se vean en un examen ocular
- Utilice lágrimas artificiales sin conservantes al menos 4 veces al día a partir de su primera infusión y hasta el final del tratamiento con BLENREP



ACERCA DE BLENREP

¿Qué es BLENREP?

BLENREP es un medicamento de venta con receta aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) que se utiliza en combinación con los medicamentos bortezomib y dexametasona para tratar a adultos con mieloma múltiple que:

- han recibido al menos 2 tratamientos previos, incluido un inhibidor del proteasoma y un agente inmunomodulador, y
- su cáncer ha reaparecido o no ha respondido a un tratamiento previo

Se desconoce si BLENREP es seguro y eficaz en niños.

¿Cómo funciona BLENREP?

BLENREP es un tratamiento dirigido que se une a una proteína que se encuentra en la superficie de las células del mieloma llamadas BCMA. BLENREP mata las células del mieloma al introducir el medicamento contra el cáncer en la célula y, a continuación, activa al sistema inmunitario como otra forma de matar las células del mieloma múltiple. El BCMA se encuentra en niveles más altos en las células de mieloma. BLENREP puede afectar a las células normales. [Vea cómo funciona BLENREP aquí.](#)

¿Cómo se estudió BLENREP?

BLENREP se administró en combinación con bortezomib y dexametasona en un estudio clínico aleatorizado a nivel mundial llamado DREAMM-7.

En DREAMM-7, se incluyó a personas con mieloma múltiple que habían recibido previamente 2 o más tratamientos, incluidos un inhibidor del proteasoma y un agente inmunomodulador, y que experimentaron progresión de la enfermedad mientras recibían su tratamiento más reciente, o después de este.

Información importante de seguridad de BLENREP (cont.)

- Evite usar lentes de contacto durante el tratamiento con BLENREP a menos que se lo indique su oftalmólogo
- Tenga cuidado al conducir u operar maquinaria, ya que BLENREP puede causar cambios en su visión

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento. Haga clic para ver la [Información de prescripción completa](#), incluido el [Recuadro de advertencias](#) y la [Guía del medicamento de BLENREP](#).

BLENREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

PREGUNTAS FRECUENTES

ACERCA DE BLENREP (CONT.)

¿Cómo recibiré BLENREP?

Se le administrará BLENREP mediante una infusión intravenosa (IV) en un centro ambulatorio certificado por el Programa de Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos (Risk Evaluation and Mitigation Strategy, REMS), como el consultorio de su médico o una clínica ambulatoria. El tiempo variará según el paciente, pero puede ser de tan solo 30 minutos. No es necesaria la hospitalización para iniciar el tratamiento con BLENREP.

- BLENREP se utiliza en combinación con bortezomib y dexametasona. La pauta posológica suele comenzar con infusiones cada 3 semanas durante los primeros 8 ciclos y, a continuación, continúa con BLENREP solo
- Su proveedor de atención médica decidirá cuántos tratamientos necesitará
- Su proveedor de atención médica controlará sus recuentos sanguíneos antes de que comience el tratamiento con BLENREP y durante el tratamiento, según sea necesario
- Si tiene efectos secundarios, su oncólogo puede ajustar su dosis. Esto podría incluir un aumento del tiempo entre las dosis o una disminución de la dosis
- Si experimenta efectos secundarios graves, su oncólogo podría interrumpir de forma temporal o permanente el tratamiento con BLENREP

CÓMO SE ADMINISTRA BLENREP

¿Por qué BLENREP solo está disponible a través de REMS?

Debido al riesgo de problemas oculares, BLENREP solo está disponible a través de un programa restringido llamado Estrategia de evaluación y mitigación de riesgos (Risk Evaluation and Mitigation Strategy, REMS) de BLENREP.

- REMS ayuda a su equipo de atención a controlar su salud ocular
- Recibirá la Guía para el paciente de BLENREP REMS de su equipo de atención
- Recibirá asesoramiento sobre el riesgo de que surjan problemas oculares y la necesidad de realizarse exámenes oculares
- Para recibir BLENREP, debe inscribirse en el programa REMS y someterse a exámenes oculares durante el tratamiento

[Obtenga más información sobre el programa BLENREP REMS aquí.](#)

Información importante de seguridad de BLENREP (cont.)

Debido al riesgo de problemas oculares, BLENREP solo está disponible a través de un programa restringido llamado Estrategia de evaluación y mitigación de riesgos (REMS) de BLENREP.

Su proveedor de atención médica le dará la Guía para el paciente del REMS de BLENREP, que describe el riesgo de problemas oculares, y le explicará el programa REMS. Para recibir BLENREP, debe inscribirse en el programa REMS y someterse a exámenes oculares durante el tratamiento. Consulte **“¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BLENREP?”** para obtener más información sobre los efectos secundarios.

CÓMO SE ADMINISTRA BLENREP (CONT.)

¿Por qué tengo que someterme a una revisión ocular?

Los problemas oculares son frecuentes con BLENREP y también pueden ser graves. BLENREP puede causar cambios en la superficie del ojo, lo que puede provocar cambios en la visión y síntomas de problemas oculares, por ejemplo:

- disminución de la visión
- sequedad ocular
- sentir que hay algo en sus ojos
- irritación ocular
- visión borrosa
- sensibilidad a la luz
- dolor ocular

También pueden aparecer úlceras en la superficie del ojo, llamadas úlceras corneales, con infecciones, durante el tratamiento con BLENREP.

Incluso si su visión parece estar bien, es importante que se someta a una revisión ocular durante el tratamiento con BLENREP, ya que algunos cambios pueden producirse sin síntomas, y es posible que solo se identifiquen en un examen ocular. Es importante que informe a su proveedor de atención médica si nota algún síntoma ocular nuevo o que empeora durante el tratamiento con BLENREP.

¿Qué tengo que hacer antes de empezar el tratamiento con BLENREP?

Se requieren exámenes oculares antes de iniciar el tratamiento con BLENREP y luego se repiten antes de cada dosis. También se necesitarán exámenes oculares adicionales para los problemas oculares nuevos o que empeoren, o como le recomiende su médico. Esto se hace para asegurarse de que su equipo de atención médica pueda controlar cualquier cambio que se produzca y determinar si es necesario un cambio en la dosis.

Los exámenes oculares incluyen:


- Prueba de la mejor agudeza visual corregida, en la que se lee una tabla optométrica desde una cierta distancia
- Prueba de lámpara de hendidura, en la que un oftalmólogo examina más de cerca la parte delantera y el interior del ojo

Información importante de seguridad de BLENREP (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BLENREP? BLENREP puede ocasionar efectos secundarios graves, que incluyen:

- Consulte **“Problemas oculares”** en **“¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre BLENREP?”**

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento. Haga clic para ver la Información de prescripción completa, incluido el Recuadro de advertencias y la Guía del medicamento de BLENREP.

 **BLENREP**
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg



PREGUNTAS FRECUENTES

CÓMO SE ADMINISTRA BLENREP (CONT.)

¿Hay algún consejo para ayudar con los problemas oculares?

Acuda a todas sus citas de oftalmología porque pueden producirse algunos cambios sin síntomas y es posible que solo se vean en un examen ocular.

Es importante que utilice lágrimas artificiales sin conservantes al menos 4 veces al día durante el tratamiento con BLENREP para ayudar a controlar los síntomas.

Debe evitar usar lentes de contacto durante el tratamiento con BLENREP, a menos que un oculista (un oftalmólogo u optometrista) le indique lo contrario.

¿Existen restricciones en ciertas actividades diarias que involucran la visión después de iniciar el tratamiento con BLENREP?

BLENREP puede causar cambios en la vista. Tenga cuidado al conducir o utilizar maquinaria. Hable con su oncólogo si no está seguro.

Además de los problemas oculares, ¿existen otros efectos secundarios graves que pueden producirse con BLENREP?

Algunos de los efectos secundarios graves que pueden producirse mientras recibe BLENREP son los siguientes:

- Es frecuente que BLENREP cause una disminución de las plaquetas (trombocitopenia), la cual también puede ser grave. Las plaquetas son un tipo de célula sanguínea que ayuda a la sangre a coagularse. Su proveedor de atención médica comprobará sus recuentos sanguíneos antes de que comience el tratamiento con BLENREP y durante el tratamiento según sea necesario. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna hemorragia o hematomas durante el tratamiento con BLENREP

CÓMO SE ADMINISTRA BLENREP (CONT.)



¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de BLENREP?

Además de los problemas oculares, los efectos secundarios más frecuentes de BLENREP cuando se administra con bortezomib y dexametasona incluyen:

- infección de las vías respiratorias superiores
- problemas hepáticos
- diarrea
- cansancio
- neumonía
- cataratas
- COVID-19

Los resultados anómalos de los análisis de sangre graves más frecuentes durante el tratamiento con BLENREP incluyen disminuciones de plaquetas, glóbulos blancos y hemoglobina, y aumentos de ciertas enzimas hepáticas.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o que empeoran de problemas pulmonares, incluidos falta de aire, dolor en el pecho o tos.

BLENREP puede afectar a la fertilidad en hombres y mujeres, lo que puede afectar a su capacidad para tener hijos. Hable con su proveedor de atención médica si esto le preocupa.


Estos no son todos los efectos secundarios posibles de BLENREP.

¿Tendré que interrumpir mi tratamiento si experimento problemas oculares?

- Si tiene efectos secundarios, su oncólogo podría ajustar su dosis
- Los ajustes pueden incluir un aumento del tiempo entre dosis o una disminución de la dosis
- Si experimenta efectos secundarios graves, su oncólogo puede interrumpir de forma temporal o completa el tratamiento con BLENREP
- Si se salta alguna cita, llame a su proveedor de atención médica lo antes posible para reprogramarla

Hable con su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Consulte la Información importante de seguridad en todo el documento. Haga clic para ver la [Información de prescripción completa](#), incluido el [Recuadro de advertencias](#) y la [Guía del medicamento de BLENREP](#).

 **BLENREP**
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

PREGUNTAS FRECUENTES

CÓMO SE ADMINISTRA BLENREP (CONT.)

¿Podría afectar BLENREP a mi visión?

Sí, los problemas oculares son frecuentes con BLENREP. BLENREP puede causar cambios en la superficie del ojo, lo que puede provocar cambios en la visión. Son frecuentes los síntomas como la disminución de la visión, la visión borrosa, la sequedad ocular, la sensibilidad a la luz, la sensación de que hay algo en sus ojos, la irritación ocular o el dolor ocular.

También pueden producirse una disminución aguda de la visión o úlceras en la superficie del ojo (úlceras corneales), con infección, durante el tratamiento con BLENREP. Es importante que informe a su proveedor de atención médica de inmediato si nota algún síntoma ocular nuevo o que empeora, o cambios en la visión durante el tratamiento con BLENREP. Su proveedor de atención médica puede disminuir su dosis o interrumpir de forma temporal o completa el tratamiento con BLENREP si experimenta efectos secundarios graves. Durante el ensayo clínico, el 83% de los pacientes necesitaron modificar la dosis debido a problemas oculares.

¿Qué debo hacer si no puedo asistir a un examen ocular?

Póngase en contacto con su oncólogo o enfermero, quien le ayudará a reprogramar su examen ocular lo antes posible, para que pueda seguir con el tratamiento. Es importante que colabore con su profesional de la atención ocular para programar su cita y evitar retrasos en la administración de la dosis de BLENREP.

¿A quién tengo que acudir para que me realicen una revisión ocular?

Los optometristas son profesionales de la atención ocular capacitados para realizar exámenes oculares, pero no son médicos. Los oftalmólogos son médicos especializados en los ojos y el cuidado de los ojos. Puede visitar cualquiera de estos profesionales que brindan atención ocular para realizar los exámenes oculares necesarios para el tratamiento con BLENREP.

Información importante de seguridad de BLENREP (cont.)

- **La disminución de plaquetas (trombocitopenia)** es frecuente con BLENREP y también puede ser grave. Las plaquetas son un tipo de célula sanguínea que ayuda a la sangre a coagularse. Su proveedor de atención médica comprobará sus recuentos sanguíneos antes de que comience el tratamiento con BLENREP y durante el tratamiento según sea necesario. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna hemorragia o hematomas durante el tratamiento con BLENREP

Los efectos secundarios más frecuentes de BLENREP cuando se administra con bortezomib y dexametasona incluyen:

- Consulte “Problemas oculares” en “¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre BLENREP?”
- infección de las vías respiratorias superiores
- problemas hepáticos
- diarrea

- cansancio
- neumonía
- cataratas
- COVID-19

APOYO Y RECURSOS

¿Qué es Together with BLENREP?

Together with BLENREP se ha diseñado para ayudar a pacientes como usted durante el tratamiento con BLENREP. Es más que un programa: es nuestra promesa comprender sus necesidades, escuchar lo que es importante para usted y crear conexiones significativas a lo largo del camino.

En el caso de los pacientes a los que se les ha recetado BLENREP, Together with BLENREP le ofrece ayuda personalizada para comenzar y mantenerse informado. Para obtener más información sobre las características del programa, visite togetherwithBLENREP.com.

¿Cómo puedo averiguar si los exámenes oculares están cubiertos por el seguro?

Puede ponerse en contacto directamente con su compañía de seguros para determinar si se cubrirán sus exámenes oculares. Si se inscribe en Together with BLENREP, el enfermero coordinador especializado comprobará su cobertura del seguro y le ayudará a comprender sus beneficios. La información proporcionada por Together with BLENREP no es garantía de cobertura o pago.

¿Qué es un enfermero coordinador de Together with BLENREP?

Su enfermero coordinador especializado es la persona que puede ayudarles a usted, al consultorio de su oncólogo y su profesional del cuidado de la visión (eye care professional, ECP) a trabajar juntos durante su tratamiento con BLENREP.

Recuerde que el enfermero coordinador no proporciona asesoramiento médico y no forma parte del equipo de atención de su médico. Pregunte a su médico cualquier duda que tenga sobre su enfermedad y el tratamiento con BLENREP.


Información importante de seguridad de BLENREP (cont.)

Los resultados anómalos de los análisis de sangre graves más frecuentes durante el tratamiento con BLENREP incluyen disminuciones de plaquetas, glóbulos blancos y hemoglobina, y aumentos de ciertas enzimas hepáticas.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o que empeoran de problemas pulmonares, incluidos falta de aire, dolor en el pecho o tos.

Su proveedor de atención médica puede disminuir su dosis o interrumpir de forma temporal o completa el tratamiento con BLENREP si experimenta efectos secundarios graves.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento. Haga clic para ver la [Información de prescripción completa](#), incluido el Recuadro de advertencias y la [Guía del medicamento de BLENREP](#).

 **BLENREP**
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

Información importante de seguridad de BLENREP

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre BLENREP?

BLENREP puede ocasionar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Problemas oculares.** Los problemas oculares son frecuentes con BLENREP y también pueden ser graves. BLENREP puede causar cambios en la superficie del ojo, lo que puede provocar síntomas de problemas oculares, como:
 - disminución de la visión
 - visión borrosa
 - sequedad ocular
 - sensibilidad a la luz
 - sensación de que hay algo en sus ojos
 - irritación ocular
 - dolor ocular

También pueden aparecer úlceras en la superficie del ojo (úlceras corneales), incluidas las infecciones, durante el tratamiento con BLENREP.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si nota algún síntoma ocular nuevo o que empeora durante el tratamiento con BLENREP.

Su proveedor de atención médica lo derivará a un especialista en oftalmología (como un oftalmólogo o un optometrista) para que le examine los ojos antes de iniciar el tratamiento, antes de recibir cada dosis de BLENREP y según sea necesario para detectar cualquier problema ocular nuevo o que empeore. **Es importante que usted:**

- Acuda a todas sus citas de oftalmología porque pueden producirse algunos cambios sin síntomas y es posible que solo se vean en un examen ocular
- Utilice lágrimas artificiales sin conservantes al menos 4 veces al día a partir de su primera infusión y hasta el final del tratamiento con BLENREP
- Evite usar lentes de contacto durante el tratamiento con BLENREP a menos que se lo indique su oftalmólogo
- Tenga cuidado al conducir u operar maquinaria, ya que BLENREP puede causar cambios en su visión

Debido al riesgo de problemas oculares, BLENREP solo está disponible a través de un programa restringido llamado Estrategia de evaluación y mitigación de riesgos (REMS) de BLENREP. Su proveedor de atención médica le dará la Guía para el paciente del REMS de BLENREP, que describe el riesgo de problemas oculares, y le explicará el programa REMS. Para recibir BLENREP, debe inscribirse en el programa REMS y someterse a exámenes oculares durante el tratamiento. Consulte **“¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BLENREP?”** para obtener más información sobre los efectos secundarios.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BLENREP?

BLENREP puede ocasionar efectos secundarios graves, que incluyen:

- Consulte **“Problemas oculares”** en **“¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre BLENREP?”**
- **La disminución de plaquetas (trombocitopenia)** es frecuente con BLENREP y también puede ser grave. Las plaquetas son un tipo de célula sanguínea que ayuda a la sangre a coagularse. Su proveedor de atención médica comprobará sus recuentos sanguíneos antes de que comience el tratamiento con BLENREP y durante el tratamiento según sea necesario. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna hemorragia o hematomas durante el tratamiento con BLENREP

Los efectos secundarios más frecuentes de BLENREP cuando se administra con bortezomib y dexametasona incluyen:

- Consulte **“Problemas oculares”** en **“¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre BLENREP?”**
- infección de las vías respiratorias superiores
- problemas hepáticos
- diarrea
- cansancio
- neumonía
- cataratas
- COVID-19

Los resultados anómalos de los análisis de sangre graves más frecuentes durante el tratamiento con BLENREP incluyen disminuciones de plaquetas, glóbulos blancos y hemoglobina, y aumentos de ciertas enzimas hepáticas.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o que empeoran de problemas pulmonares, incluidos falta de aire, dolor en el pecho o tos.

Su proveedor de atención médica puede disminuir su dosis o interrumpir de forma temporal o completa el tratamiento con BLENREP si experimenta efectos secundarios graves.

BLENREP puede afectar a la fertilidad en hombres y mujeres, lo que puede afectar su capacidad para tener hijos. Hable con su proveedor de atención médica si esto le preocupa.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de BLENREP.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Antes de recibir BLENREP, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- tiene o ha tenido problemas de visión u oculares;
- tiene o ha tenido problemas hemorrágicos;
- está embarazada o planea quedar embarazada. BLENREP puede dañar al feto

Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Su proveedor de atención médica le hará una prueba de embarazo antes de que comience el tratamiento con BLENREP
- Utilice un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con BLENREP y durante 4 meses después de la última dosis. Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que puede usar durante este período
- Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada o cree que podría estarlo durante el tratamiento con BLENREP

Varones con parejas de sexo femenino que pueden quedar embarazadas:


- Utilice un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con BLENREP y durante 6 meses después de la última dosis
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si BLENREP pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con BLENREP y durante 3 meses después de la última dosis

Informe a su proveedor de salud sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Se le sugiere que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta.

Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088. También puede informar los efectos secundarios negativos a GSK en gsk.public.reportum.com o llamando al 1-888-825-5249.

Haga clic para ver la [Información de prescripción completa](#), incluido el [Recuadro de advertencias](#) y la [Guía del medicamento de BLENREP](#).



**Si no se ha inscrito en
Together with BLENREP,
inscríbese hoy mismo.**



**Haga clic en el siguiente enlace para inscribirse
y acceder a recursos adicionales, enfermeros
coordinadores,* y mucho más.**



Estamos aquí para ayudar.

Puede ponerse en contacto con su enfermero coordinador al teléfono **1-844-4GSK-ONC** (1-844-447-5662), de lunes a viernes, de 8:00 A M a 8:00 P M, hora del Este, o visite togetherwithBLENREP.com

*El enfermero coordinador no proporciona asesoramiento médico y no forma parte del equipo de atención de su médico. Pregunte a su médico cualquier duda que pueda tener sobre su enfermedad y el tratamiento con BLENREP.

**Consulte la Información importante de seguridad en todo el documento.
Haga clic para ver la Información de prescripción completa, incluido el
Recuadro de advertencias y la Guía del medicamento de BLENREP.**

Las marcas comerciales son propiedad o licenciadas del grupo de compañías de GSK.

GSK

©2026 GSK or licensor.
PMUS-BLMLBND250046 January 2026
Produced in USA.



BLENREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

Nombre del archivo: Preguntas frecuentes