

Cómo cuidar de sus ojos mientras recibe BLENREP



Esta guía le ayudará a comprender los problemas oculares que pueden producirse durante el tratamiento.

Uso aprobado

BLENREP es un medicamento de venta con receta que se utiliza en combinación con los medicamentos bortezomib y dexametasona para tratar a adultos con mieloma múltiple que:

- han recibido al menos 2 tratamientos previos, incluido un inhibidor del proteasoma y un agente inmunomodulador, y
- su cáncer ha reaparecido o no ha respondido a un tratamiento previo

Se desconoce si BLENREP es seguro y eficaz en niños.

Información importante de seguridad

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre BLENREP? BLENREP puede ocasionar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Problemas oculares.** Los problemas oculares son frecuentes con BLENREP y también pueden ser graves. BLENREP puede causar cambios en la superficie del ojo, lo que puede provocar síntomas de problemas oculares, como:

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| - disminución de la visión | - sequedad ocular | - sentir que hay algo en sus ojos | - irritación ocular |
| - visión borrosa | - sensibilidad a la luz | | - dolor ocular |

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento. Haga clic para ver la Información de prescripción completa, incluido el Recuadro de advertencias y la Guía del medicamento de BLENREP.



BLENREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

Acerca de BLENREP

BLENREP es un tratamiento dirigido que funciona de varias maneras




Cómo funciona BLENREP

BLENREP se une a una proteína que se encuentra en la superficie de las células de mieloma llamadas BCMA

BLENREP MATA LAS CÉLULAS DEL MIELOMA

al introducir el medicamento contra el cáncer en la célula.



BLENREP ACTIVA EL SISTEMA INMUNITARIO

como otra forma de destruir las células del mieloma múltiple

El BCMA se encuentra en niveles más altos en las células de mieloma. BLENREP puede afectar a las células normales.

BLENREP es el primer tratamiento de este tipo y se administra en combinación con bortezomib y dexametasona.

Debido a esto, se lo supervisará estrechamente para detectar estos tipos de cambios durante el tratamiento.

Información importante de seguridad de BLENREP (cont.)

También pueden aparecer úlceras en la superficie del ojo (úlceras corneales), incluidas las infecciones, durante el tratamiento con BLENREP.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si nota algún síntoma ocular nuevo o que empeora durante el tratamiento con BLENREP.

Cómo puede afectar BLENREP a la superficie de los ojos

Los problemas oculares de BLENREP pueden producirse por daños en las células de la superficie del ojo, específicamente en la córnea. BLENREP está diseñado para atacar las células cancerosas, pero también puede tener un efecto en las células normales, lo que provoca cambios en la capa superficial del ojo.

Acuda a todas sus citas de oftalmología porque pueden producirse algunos cambios sin síntomas y es posible que solo se vean en un examen ocular.

Es importante que consulte a un médico de la vista (como un oftalmólogo o un optometrista) antes de comenzar el tratamiento, antes de recibir cada dosis de BLENREP, y según sea necesario para detectar cualquier problema ocular nuevo o que empeore.




Información importante de seguridad de BLENREP (cont.)

Su proveedor de atención médica lo derivará a un especialista en oftalmología (como un oftalmólogo o un optometrista) para que le examine los ojos antes de iniciar el tratamiento, antes de recibir cada dosis de BLENREP y según sea necesario para detectar cualquier problema ocular nuevo o que empeore. **Es importante que usted:**

- Acuda a todas sus citas de oftalmología porque pueden producirse algunos cambios sin síntomas y es posible que solo se vean en un examen ocular
- Utilice lágrimas artificiales sin conservantes al menos 4 veces al día a partir de su primera infusión y hasta el final del tratamiento con BLENREP

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento. Haga clic para ver la [Información de prescripción completa](#), incluido el Recuadro de advertencias y la [Guía del medicamento de BLENREP](#).

 **BLENREP**
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

Qué esperar al empezar a recibir BLENREP



Infusión de ~30 minutos

Se le administrará BLENREP mediante una infusión intravenosa (i.v.) en un centro ambulatorio certificado por el Programa de Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos (Risk Evaluation and Mitigation Strategy, REMS), como el consultorio de su médico o una clínica ambulatoria. El tiempo variará según el paciente, pero puede ser de tan solo 30 minutos. **No es necesaria la hospitalización para iniciar el tratamiento** con BLENREP.



Pauta posológica y monitorización sanguínea

BLENREP se administra normalmente **cada 3 semanas** en combinación con bortezomib y dexametasona durante los primeros 8 ciclos, y después el tratamiento continúa con BLENREP solo. Su proveedor de atención médica decidirá cuántos tratamientos necesitará y controlará sus recuentos sanguíneos antes de que comience el tratamiento con BLENREP y durante el tratamiento, según sea necesario.

Información importante de seguridad de BLENREP (cont.)

- Evite usar lentes de contacto durante el tratamiento con BLENREP a menos que se lo indique su oftalmólogo
- Tenga cuidado al conducir u operar maquinaria, ya que BLENREP puede causar cambios en su visión

Debido al riesgo de problemas oculares, BLENREP solo está disponible a través de un programa restringido llamado Estrategia de evaluación y mitigación de riesgos (Risk Evaluation and Mitigation Strategy, REMS) de BLENREP. Su proveedor de atención médica le dará la Guía para el paciente del REMS de BLENREP, que describe el riesgo de problemas oculares, y le explicará el programa REMS. Para recibir BLENREP, debe inscribirse en el programa REMS y someterse a exámenes oculares durante el tratamiento. Consulte “**¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BLENREP?**” para obtener más información sobre los efectos secundarios.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BLENREP?

BLENREP puede ocasionar efectos secundarios graves, que incluyen:

- Consulte “**Problemas oculares**” en “**¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre BLENREP?**”



Exámenes oculares necesarios antes de cada dosis

Se requieren exámenes oculares antes de iniciar el tratamiento con BLENREP y luego se repiten antes de cada dosis. También se necesitarán exámenes oculares adicionales para síntomas nuevos o que empeoren, o como le recomiende su médico.

Si tiene efectos secundarios, su oncólogo podría ajustar su dosis.

- Los ajustes pueden incluir un aumento del tiempo entre dosis o una disminución de la dosis
- Si experimenta efectos secundarios graves, su oncólogo puede interrumpir de forma temporal o completa el tratamiento con BLENREP
- Si se salta alguna cita, llame a su proveedor de atención médica lo antes posible para reprogramarla

Hable con su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Información importante de seguridad de BLENREP (cont.)

- **La disminución de plaquetas (trombocitopenia)** es frecuente con BLENREP y también puede ser grave. Las plaquetas son un tipo de célula sanguínea que ayuda a la sangre a coagularse. Su proveedor de atención médica comprobará sus recuentos sanguíneos antes de que comience el tratamiento con BLENREP y durante el tratamiento según sea necesario. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna hemorragia o hematomas durante el tratamiento con BLENREP

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento. Haga clic para ver la [Información de prescripción completa](#), incluido el Recuadro de advertencias y la [Guía del medicamento de BLENREP](#).

BLENREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

Efectos secundarios de BLENREP



La información más importante que debe conocer sobre BLENREP

BLENREP puede ocasionar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Problemas oculares**, que son frecuentes con BLENREP y también pueden ser graves. BLENREP puede causar cambios en la superficie del ojo, lo que puede provocar síntomas de problemas oculares, como:

- disminución de la visión
- visión borrosa
- sequedad ocular
- sensibilidad a la luz
- sentir que hay algo en sus ojos
- irritación ocular
- dolor ocular

También pueden aparecer úlceras en la superficie del ojo (úlceras corneales), incluidas las infecciones, durante el tratamiento con BLENREP.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si nota algún síntoma ocular nuevo o que empeora durante el tratamiento con BLENREP.

Su proveedor de atención médica lo derivará a un médico de la vista (como un oftalmólogo o un optometrista) para que le examine los ojos antes de iniciar el tratamiento, antes de recibir cada dosis de BLENREP, y según sea necesario para detectar cualquier problema ocular nuevo o que empeore. **Es importante que usted:**

- Acuda a todas sus citas de oftalmología porque pueden producirse algunos cambios sin síntomas y es posible que solo se vean en un examen ocular
- Utilice lágrimas artificiales sin conservantes al menos 4 veces al día a partir de su primera infusión y hasta el final del tratamiento con BLENREP
- Evite usar lentes de contacto durante el tratamiento con BLENREP a menos que se lo indique su médico de la vista
- Tenga cuidado al conducir u operar maquinaria, ya que BLENREP puede causar cambios en su visión

Debido al riesgo de problemas oculares, BLENREP solo está disponible a través de un programa restringido llamado Estrategia de evaluación y mitigación de riesgos (REMS) de BLENREP. Su proveedor de atención médica le dará la Guía para el paciente del REMS de BLENREP, que describe el riesgo de problemas oculares, y le explicará el programa REMS. Para recibir BLENREP, debe inscribirse en el programa REMS y someterse a exámenes oculares durante el tratamiento.

Los efectos secundarios graves adicionales pueden incluir:

- **La disminución de plaquetas (trombocitopenia)** es frecuente con BLENREP y también puede ser grave. Las plaquetas son un tipo de célula sanguínea que ayuda a la sangre a coagularse. Su proveedor de atención médica comprobará sus recuentos sanguíneos antes de que comience el tratamiento con BLENREP y durante el tratamiento según sea necesario. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna hemorragia o hematomas durante el tratamiento con BLENREP

Además de los problemas oculares, los efectos secundarios más frecuentes de BLENREP cuando se administra con bortezomib y dexametasona incluyen:

- infección de las vías respiratorias superiores
- problemas hepáticos
- diarrea
- cansancio
- neumonía
- cataratas
- COVID-19

Los resultados anómalos de los análisis de sangre graves más frecuentes durante el tratamiento con BLENREP incluyen disminuciones de plaquetas, glóbulos blancos y hemoglobina, y aumentos de ciertas enzimas hepáticas.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o que empeoran de problemas pulmonares, incluidos falta de aire, dolor en el pecho o tos.

Su proveedor de atención médica puede disminuir su dosis o interrumpir de forma temporal o completa el tratamiento con BLENREP si experimenta efectos secundarios graves.

BLENREP puede afectar a la fertilidad en hombres y mujeres, lo que puede afectar a su capacidad para tener hijos. Hable con su proveedor de atención médica si esto le preocupa.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de BLENREP.

Consulte la Información importante de seguridad en todo el documento. Haga clic para ver la [Información de prescripción completa](#), incluido el Recuadro de advertencias y la [Guía del medicamento de BLENREP](#).

 **BLENREP**
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg


Problemas oculares

Los problemas oculares, como los cambios en la visión, son frecuentes con BLENREP

Los cambios en la visión con BLENREP se midieron mediante la prueba de la tabla optométrica conocida como la prueba de la mejor agudeza visual corregida (MAVC).

En DREAMM-7, casi todas las personas (89%) que recibieron tratamiento con la combinación con BLENREP presentaron una reducción de la MAVC en al menos 1 ojo. Esto significa que su visión era menos nítida incluso con lentes correctores.

Para personas que experimentaron una reducción de la MAVC en al menos 1 ojo



Las imágenes son solo con fines ilustrativos. La visión será diferente para cada persona. Imágenes creadas con un oftalmólogo.

Hable con su médico para obtener más información sobre los cambios en la visión mientras toma BLENREP

Exámenes oculares




Antes de cada dosis de BLENREP, su médico de la vista realizará 2 exámenes comunes:



Prueba de la mejor agudeza visual corregida (MAVC)

Mide el grado de agudeza visual, normalmente leyendo una tabla optométrica a distancia.



Prueba de lámpara de hendidura

Un médico de la vista examina más de cerca la parte delantera y el interior del ojo.

Información importante de seguridad de BLENREP (cont.)

Los efectos secundarios más frecuentes de BLENREP cuando se administra con bortezomib y dexametasona incluyen:

- Consulte "Problemas oculares" en "¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre BLENREP?"
- infección de las vías respiratorias superiores
- problemas hepáticos
- diarrea
- cansancio
- neumonía
- cataratas
- COVID-19

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento. Haga clic para ver la [Información de prescripción completa](#), incluido el Recuadro de advertencias y la [Guía del medicamento de BLENREP](#).

BLENREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

Información importante de seguridad de BLENREP

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre BLENREP?
BLENREP puede ocasionar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Problemas oculares.** Los problemas oculares son frecuentes con BLENREP y también pueden ser graves. BLENREP puede causar cambios en la superficie del ojo, lo que puede provocar síntomas de problemas oculares, como:
 - disminución de la visión
 - sensación de que hay algo en sus ojos
 - visión borrosa
 - irritación ocular
 - sequedad ocular
 - dolor ocular
 - sensibilidad a la luz

También pueden aparecer úlceras en la superficie del ojo (úlceras corneales), incluidas las infecciones, durante el tratamiento con BLENREP.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si nota algún síntoma ocular nuevo o que empeora durante el tratamiento con BLENREP.

Su proveedor de atención médica lo derivará a un especialista en oftalmología (como un oftalmólogo o un optometrista) para que le examine los ojos antes de iniciar el tratamiento, antes de recibir cada dosis de BLENREP y según sea necesario para detectar cualquier problema ocular nuevo o que empeore.

Es importante que usted:

- Acuda a todas sus citas de oftalmología porque pueden producirse algunos cambios sin síntomas y es posible que solo se vean en un examen ocular
- Utilice lágrimas artificiales sin conservantes al menos 4 veces al día a partir de su primera infusión y hasta el final del tratamiento con BLENREP
- Evite usar lentes de contacto durante el tratamiento con BLENREP a menos que se lo indique su oftalmólogo
- Tenga cuidado al conducir u operar maquinaria, ya que BLENREP puede causar cambios en su visión

Debido al riesgo de problemas oculares, BLENREP solo está disponible a través de un programa restringido llamado Estrategia de evaluación y mitigación de riesgos (REMS) de BLENREP. Su proveedor de atención médica le dará la Guía para el paciente del REMS de BLENREP, que describe el riesgo de problemas oculares, y le explicará el programa REMS. Para recibir BLENREP, debe inscribirse en el programa REMS y someterse a exámenes oculares durante el tratamiento. Consulte **“¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BLENREP?”** para obtener más información sobre los efectos secundarios.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BLENREP?

BLENREP puede ocasionar efectos secundarios graves, que incluyen:

- Consulte **“Problemas oculares”** en **“¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre BLENREP?”**
- **La disminución de plaquetas (trombocitopenia)** es frecuente con BLENREP y también puede ser grave. Las plaquetas son un tipo de célula sanguínea que ayuda a la sangre a coagularse. Su proveedor de atención médica comprobará sus recuentos sanguíneos antes de que comience el tratamiento con BLENREP y durante el tratamiento según sea necesario. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna hemorragia o hematomas durante el tratamiento con BLENREP

Los efectos secundarios más frecuentes de BLENREP cuando se administra con bortezomib y dexametasona incluyen:

- Consulte **“Problemas oculares”** en **“¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre BLENREP?”**
- infección de las vías respiratorias superiores
- problemas hepáticos
- diarrea
- cansancio
- neumonía
- cataratas
- COVID-19

Los resultados anómalos de los análisis de sangre graves más frecuentes durante el tratamiento con BLENREP incluyen disminuciones de plaquetas, glóbulos blancos y hemoglobina, y aumentos de ciertas enzimas hepáticas.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o que empeoran de problemas pulmonares, incluidos falta de aire, dolor en el pecho o tos.

Su proveedor de atención médica puede disminuir su dosis o interrumpir de forma temporal o completa el tratamiento con BLENREP si experimenta efectos secundarios graves.

BLENREP puede afectar a la fertilidad en hombres y mujeres, lo que puede afectar a su capacidad para tener hijos. Hable con su proveedor de atención médica si esto le preocupa.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de BLENREP.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Haga clic para ver la [Información de prescripción completa, incluido el Recuadro de advertencias y la Guía del medicamento de BLENREP.](#)

**BLENREP**
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

Información importante de seguridad de BLENREP (cont.)

Antes de recibir BLENREP, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- tiene o ha tenido problemas de visión u oculares;
- tiene o ha tenido problemas hemorrágicos;
- está embarazada o planea quedar embarazada. BLENREP puede dañar al feto

Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Su proveedor de atención médica le hará una prueba de embarazo antes de que comience el tratamiento con BLENREP
- Utilice un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con BLENREP y durante 4 meses después de la última dosis. Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que puede usar durante este período
- Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada o cree que podría estarlo durante el tratamiento con BLENREP


Varones con parejas de sexo femenino que pueden quedar embarazadas:

- Utilice un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con BLENREP y durante 6 meses después de la última dosis
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si BLENREP pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con BLENREP y durante 3 meses después de la última dosis

Informe a su proveedor de salud sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Se le sugiere que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al **1-800-FDA-1088. También puede informar los efectos secundarios negativos a GSK en gsk.public.reportum.com o llamando al **1-888-825-5249**.**

Haga clic para ver la [Información de prescripción completa, incluido el Recuadro de advertencias y la Guía del medicamento de BLENREP.](#)

 **BLENREP**
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

**Si no se ha inscrito en
Together with BLENREP,
inscríbese hoy mismo.**



**Haga clic en el siguiente enlace para inscribirse
y acceder a recursos adicionales, enfermeros
coordinadores,* y mucho más.**



Estamos aquí para ayudar.

Puede ponerse en contacto con su enfermero coordinador al teléfono **1-844-4GSK-ONC** (1-844-447-5662), de lunes a viernes, de 8:00 A M a 8:00 P M, hora del Este, o visite togetherwithBLENREP.com

* El enfermero coordinador no proporciona asesoramiento médico y no forma parte del equipo de atención de su médico. Pregunte a su médico cualquier duda que pueda tener sobre su enfermedad y el tratamiento con BLENREP.

**Consulte la Información importante de seguridad en todo el documento.
Haga clic para ver la Información de prescripción completa, incluido el
Recuadro de advertencias y la Guía del medicamento de BLENREP.**

Las marcas comerciales son propiedad o licenciadas del grupo de compañías de GSK.



©2026 GSK or licensor.
PMUS-BLMLBND250048 January 2026
Produced in USA.

Nombre del archivo: Cómo cuidar de sus ojos

 **BLENREP**
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg