



# BLNREP

## 점안액 프로그램

이 브로셔는 BLNREP을 투여받는 환자에게 안약을 무료로 제공하는 BLNREP 점안액 프로그램에 대한 주요 정보를 제공합니다.

### 승인된 용도

BLNREP은 다음과 같은 다발성 골수종이 있는 성인을 치료하기 위해 보르테조미드 및 덱사메타손 약물과 병용하여 사용되는 처방약입니다.

- 프로테아좀 억제제 및 면역조절제를 포함하여 이전에 최소 2회의 치료를 받은 경우, 그리고
- 암이 재발했거나 이전 치료에 반응하지 않은 경우

BLNREP이 소아에서 안전하고 효과적인지 여부는 알려져 있지 않습니다.

### 중요한 안전성 정보

**BLNREP에 대해 알아야 할 가장 중요한 정보는 무엇입니까?**

**BLNREP은 다음을 포함한 중대한 부작용을 유발할 수 있습니다.**

- **눈 문제.** 눈 문제는 BLNREP에서 흔하며 또한 중증일 수 있습니다. BLNREP은 눈 표면의 변화를 유발할 수 있으며, 이는 다음을 포함한 눈 문제의 증상으로 이어질 수 있습니다
  - 시력 감소
  - 안구 건조
  - 눈에 무언가가 있는 것 같은 느낌
  - 눈 자극
  - 눈 통증
  - 흐린 시야
  - 빛에 대한 민감성

중요한 추가 안전성 정보 전체를 참조하십시오.  
BLNREP에 대한 박스형 경고 및 투약 안내서를 포함하여  
전체 처방 정보를 보려면 클릭하십시오.



**BLNREP**  
belantamab  
mafodotin-blmf  
for injection 70 mg

## BLNREP 점안액 프로그램에 참여하십시오



### 점안액 프로그램은 치료 중에 점안액을 보내 귀하를 지원합니다.

첫 번째 BLNREP 주입부터 시작하여, 귀하는 하루에 최소 4회 또는 담당 의사의 지시에 따라 무방부제 유회 점안액을 사용해야 합니다. 이 점안액은 진료 계획의 중요한 부분이며, 점안액 프로그램은 치료 여정 중에 귀하를 지원하는 방법입니다. 점안액은 귀하가 투여를 받는 동안 귀하의 가정으로 직접 배송될 것입니다.

### BLNREP의 중요한 안전성 정보(계속)

**BLNREP에 대해 알아야 할 가장 중요한 정보는 무엇입니까? (계속)**  
**BLNREP은 다음을 포함한 중대한 부작용을 유발할 수 있습니다.**

BLNREP 투여 기간 동안 감염을 포함한 눈 표면의 궤양(각막 궤양)이 발생할 수도 있습니다.

**BLNREP 투여 기간 동안 새로운 눈 증상이나 악화된 눈 증상 또는 시력 변화를 발견하는 경우, 즉시 담당 의료진에게 알려주세요.**

담당 의료진이 투여를 시작하기 전, 각 BLNREP 용량을 투여받기 전, 그리고 일체의 새로운 눈 문제나 악화된 눈 문제에 대해 필요에 따라 눈을 검사하기 위해 귀하를 안과 전문가(예: 안과전문의 또는 검안사)에게 의뢰할 것입니다. **다음은 수행하는 것이 중요합니다.**

- 일부 변화는 증상 없이 발생할 수 있고 눈 검사에서만 관찰될 수 있으므로 모든 눈관리 예약을 지킵니다
- 첫 주입부터 시작하여 BLNREP 투여 종료 시까지 하루에 최소 4회 무방부제 인공눈물을 사용합니다
- 안과 전문의의 지시가 없는 한, BLNREP 치료 기간 동안 콘택트 렌즈 착용을 피합니다
- BLNREP은 시력을 변화시킬 수 있으므로 운전 또는 기계 조작 시 주의합니다

## 자주 묻는 질문

### 적합성

#### Q. 제가 점안액 프로그램에 참여할 자격이 있는지 어떻게 알 수 있습니까?

- 담당 의사가 BLNREP을 처방할 때, 귀하는 BLNREP 위험 평가 및 완화 전략(REMS) 프로그램에 등록해야 합니다
- 귀하는 미국(컬럼비아 특별구, 푸에르토리코 및 미국령 버진 아일랜드 포함) 거주자여야 합니다
- BLNREP을 처방하는 담당 의사도 미국 거주자여야 합니다
- 점안액을 원하시는 경우 Together with BLNREP 등록 양식의 상자에 체크 표시하여 점안액 프로그램에 등록할 수 있습니다. 점안액을 받기 위해 Together with BLNREP 등록이 필요하지는 않습니다

### 등록

#### Q. 프로그램에 어떻게 등록합니까?

등록하려면 귀하와 담당 의사가 Together with BLNREP 등록 양식의 해당 섹션을 작성해야 합니다. Together with BLNREP 웹사이트에서 이용 가능한 양식을 작성할 때 점안액 프로그램 옆의 상자에 반드시 표시해야 합니다.

#### Q. 등록 후 점안액은 어떻게 받게 됩니까?

등록 후, 점안액 프로그램에서 귀하에게 연락할 것입니다. 점안액 프로그램은 점안액을 집으로 직접 보낼 수 있도록 배송 주소를 확인할 것입니다.

### BLNREP의 중요한 안전성 정보(계속)

눈 문제의 위험으로 인해, **BLNREP은 BLNREP 위험 평가 및 완화 전략(REMS)이라는 제한된 프로그램을 통해서만 이용할 수 있습니다.** 담당 의료진이 눈 문제의 위험을 설명하는 BLNREP REMS 환자 안내서를 제공하고 REMS 프로그램에 대해 설명해 드릴 것입니다. BLNREP을 투여받기 위해서는 REMS 프로그램에 등록하고 투여 기간 동안 눈 검사를 받아야 합니다. 부작용에 대한 자세한 정보는 “**BLNREP의 가능한 부작용은 무엇입니까?**”를 참조하십시오.

**중요한 추가 안전성 정보 전체를 참조하십시오. BLNREP에 대한 박스형 경고 및 투약 안내서를 포함하여 전체 처방 정보를 보려면 클릭하십시오.**

 **BLNREP**  
belantamab  
mafodotin-blmf  
for injection 70 mg

# 자주 묻는 질문(계속)



## 점안액 정보

### Q. 제 점안액 브랜드를 선택할 수 있습니까?

원하는 경우 다른 점안액을 사용하실 수 있지만, 무료 프로그램에는 포함되지 않습니다. 점안액을 구입하시는 경우 무방부제 안약을 선택하는 것이 중요합니다. 눈관리 전문가의 조언을 따라야 합니다. BLENREP은 특정 브랜드를 보증하지 않습니다.

### Q. 점안액 프로그램 또는 무방부제 점안액에 대한 질문에 답변할 수 있는 사람은 누구인가요?

질문이 있는 경우 점안액 프로그램에 문의할 수 있습니다. 이들이 도와드릴 것입니다. 월요일~금요일, 오전 8시~오후 8시에 1-844-4GSK-ONC(1-844-447-5662)로 전화하십시오.

### Q. 점안액은 얼마나 오래 지속됩니까?

귀하의 BLENREP 처방과 REMS 등록이 확인된 후, 60개 바이알이 포함된 점안액 공급품 초기 배송을 받게 될 것입니다. 점안액은 귀하의 주소로 배송될 것입니다.

BLENREP의 지속적인 사용과 REMS 등록이 확인된 후, 귀하는 다음 2개월 기간 동안 50일마다 추가로 60개 바이알 공급량의 점안액을 받게 될 것입니다. 이는 귀하가 투여를 중단하거나 프로그램에서 탈퇴할 때까지 계속됩니다. 점안액 프로그램에서 제47일에 귀하가 여전히 투여를 받고 있는지 확인할 것입니다.

## BLENREP의 중요한 안전성 정보(계속)

BLENREP의 가능한 부작용은 무엇입니까?

BLENREP은 다음을 포함한 중대한 부작용을 유발할 수 있습니다.

- “BLENREP에 대해 알아야 할 가장 중요한 정보는 무엇입니까?”의 “눈 문제”를 참조하십시오
- **혈소판 감소(혈소판감소증)**는 BLENREP에서 흔하며 중증일 수도 있습니다. 혈소판은 혈액 응고를 돕는 혈액 세포의 한 종류입니다. 담당 의료진이 귀하가 BLENREP 투여를 시작하기 전과 필요에 따라 투여 기간 동안 혈액 세포 수를 확인할 것입니다. BLENREP 투여 기간 동안 출혈 또는 멍이 발생하는 경우 담당 의료진에게 알려십시오

# 자주 묻는 질문(계속)

## 점안액 정보(계속)

### Q. 점안액은 어떻게 보관해야 합니까?

점안액은 실온에서 보관해야 합니다.

### Q. 점안액을 콘택트 렌즈와 함께 사용할 수 있습니까?

아니요, 의사의 지시가 없는 한, BLENREP을 복용하는 동안 시력 교정을 위한 콘택트렌즈를 착용해서는 안 됩니다.

## 비용/보험

### Q. 프로그램과 관련된 비용이 있습니까?

아니요, 적합한 환자에 대해 이 프로그램과 관련된 비용은 없습니다.

### Q. 점안액 프로그램에 참여하기 위해 보험 정보를 제공해야 합니까?

아니요, 점안액 프로그램에만 참여하고자 하는 경우 보험 정보를 제공할 필요는 없습니다. Together with BLENREP 등록 양식에서 등록을 원하는 등록 양식 란에 체크하고 본인과 담당 의사의 서명을 제공하기만 하면 됩니다.

## BLENREP의 중요한 안전성 정보(계속)


보르테조미 및 덱사메타손과 병용 투여 시 BLENREP의 가장 흔한 부작용은 다음과 같습니다.

- |                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| • “BLENREP에 대해 알아야 할 가장 중요한 정보는 무엇입니까?”의 “눈 문제”를 참조하십시오 | • 설사       |
| • 상기도 감염                                                | • 피로감      |
| • 간 문제                                                  | • 폐렴       |
|                                                         | • 백내장      |
|                                                         | • COVID-19 |

BLENREP 투여 기간 동안 가장 흔한 중증 혈액 검사 이상 결과에는 혈소판, 백혈구, 헤모글로빈 감소, 특정 간 효소 증가가 포함됩니다.

숨가쁨, 흉통 또는 기침을 포함해 폐 문제의 새로운 또는 악화된 설명되지 않는 징후 또는 증상이 발생하는 경우, 즉시 담당 의료진에게 알려십시오.

중요한 추가 안전성 정보 전체를 참조하십시오. BLENREP에 대한 박스형 경고 및 투약 안내서를 포함하여 전체 처방 정보를 보려면 클릭하십시오.



**BLNREP의 중요한 안전성 정보**

**BLNREP에 대해 알아야 할 가장 중요한 정보는 무엇입니까?**

**BLNREP은 다음을 포함한 중대한 부작용을 유발할 수 있습니다.**

- **눈 문제.** 눈 문제는 BLNREP에서 흔하며 또한 중증일 수 있습니다. BLNREP은 눈 표면의 변화를 유발할 수 있으며, 이는 다음을 포함한 눈 문제의 증상으로 이어질 수 있습니다
  - 시력 감소
  - 눈에 무언가가 있는 것 같은 느낌
  - 흐린 시야
  - 눈 자극
  - 안구 건조
  - 눈 통증
  - 빛에 대한 민감성

BLNREP 투여 기간 동안 감염을 포함한 눈 표면의 궤양(각막 궤양)이 발생할 수도 있습니다.

**BLNREP 투여 기간 동안 새로운 눈 증상이나 악화된 눈 증상 또는 시력 변화를 발견하는 경우, 즉시 담당 의료진에게 알려주세요.**

담당 의료진이 투여를 시작하기 전, 각 BLNREP 용량을 투여받기 전, 그리고 일체의 새로운 눈 문제나 악화된 눈 문제에 대해 필요에 따라 눈을 검사하기 위해 귀하를 안과 전문가(예: 안과전문의 또는 검안사)에게 의뢰할 것입니다. 다음을 수행하는 것이 중요합니다.

- 일부 변화는 증상 없이 발생할 수 있고 눈 검사에서만 관찰될 수 있으므로 모든 눈관리 예약을 지킵니다
- 첫 주입부터 시작하여 BLNREP 투여 종료 시까지 하루에 최소 4회 무방부제 인공눈물을 사용합니다
- 안과 전문의의 지시가 없는 한, BLNREP 치료 기간 동안 콘택트 렌즈 착용을 피합니다
- BLNREP은 시력을 변화시킬 수 있으므로 운전 또는 기계 조작 시 주의합니다

눈 문제의 위험으로 인해, **BLNREP은 BLNREP 위험 평가 및 완화 전략(REMS)이라는 제한된 프로그램을 통해서만 이용할 수 있습니다.** 담당 의료진이 눈 문제의 위험을 설명하는 BLNREP REMS 환자 안내서를 제공하고 REMS 프로그램에 대해 설명해 드릴 것입니다. BLNREP을 투여받기 위해서는 REMS 프로그램에 등록하고 투여 기간 동안 눈 검사를 받아야 합니다. 부작용에 대한 자세한 정보는 “**BLNREP의 가능한 부작용은 무엇입니까?**”를 참조하십시오.

**BLNREP의 가능한 부작용은 무엇입니까?**

**BLNREP은 다음을 포함한 중대한 부작용을 유발할 수 있습니다.**

- “**BLNREP에 대해 알아야 할 가장 중요한 정보는 무엇입니까?**”의 “**눈 문제**”를 참조하십시오
- **혈소판 감소(혈소판감소증)**는 BLNREP에서 흔하며 중증일 수도 있습니다. 혈소판은 혈액 응고를 돕는 혈액 세포의 한 종류입니다. 담당 의료진이 귀하가 BLNREP 투여를 시작하기 전과 필요에 따라 투여 기간 동안 혈액 세포 수를 확인할 것입니다. BLNREP 투여 기간 동안 출혈 또는 멍이 발생하는 경우 담당 의료진에게 알려주세요

보르테조밍 및 덱사메타손과 병용 투여 시 **BLNREP의 가장 흔한 부작용은 다음과 같습니다.**

- “**BLNREP에 대해 알아야 할 가장 중요한 정보는 무엇입니까?**”의 “**눈 문제**”를 참조하십시오
- 상기도 감염
- 간 문제
- 설사
- 피로감
- 폐렴
- 백내장
- COVID-19

**BLNREP 투여 기간 동안 가장 흔한 중증 혈액 검사 이상 결과에는** 혈소판, 백혈구, 헤모글로빈 감소, 특정 간 효소 증가가 포함됩니다.

숨가쁨, 흉통 또는 기침을 포함해 폐 문제의 새로운 또는 악화된 설명되지 않는 징후 또는 증상이 발생하는 경우, 즉시 담당 의료진에게 알려주세요.

귀하가 중대한 부작용을 경험하는 경우, 담당 의료진이 BLNREP 용량을 감량하거나, BLNREP 투여를 일시적으로 중단하거나, 완전히 중단할 수 있습니다.

BLNREP은 남성과 여성의 생식력에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 귀하의 가임 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 이것이 우려되는 경우 담당 의료진과 상의하십시오.

이는 BLNREP의 가능한 모든 부작용이 아닙니다.

**부작용에 대한 의학적 조언을 구하려면 담당 의사에게 전화하십시오. 1-800-FDA-1088로 FDA에 부작용을 보고할 수 있습니다.**

**BLNREP을 투여받기 전, 다음과 같은 경우를 포함한 모든 의학적 상태에 관해 담당 의료진에게 알려주세요.**

- 시력 또는 눈 문제가 있거나 있었던 경우
- 출혈 문제가 있거나 있었던 경우
- 임신 중이거나 임신을 계획하고 있는 경우. BLNREP은 태아에게 해를 끼칠 수 있습니다

**가임 여성:**

- 귀하가 BLNREP 투여를 시작하기 전에 담당 의료진이 임신 검사를 실시할 것입니다
- BLNREP 투여 기간 동안과 마지막 투여 후 4개월 동안 효과적인 피임법을 사용하십시오. 이 기간 동안 사용할 수 있는 피임법에 대해 담당 의료진과 상의하십시오
- BLNREP 투여 기간 동안 임신하게 되거나 임신했을 수 있다고 생각하는 경우, 담당 의료진에게 알려주세요

**가임 여성 파트너가 있는 남성:**


- BLNREP 투여 기간 동안과 마지막 투여 후 6개월 동안 효과적인 피임법을 사용하십시오
- 모유 수유 중이거나 모유 수유를 계획하고 있는 경우. BLNREP이 모유로 분비되는지 여부는 알려져 있지 않습니다. BLNREP 투여 기간 동안과 마지막 투여 후 3개월 동안 모유 수유를 하지 마십시오

처방약 및 일반의약품, 비타민, 생약 보충제를 포함하여 귀하가 복용하는 모든 약물에 대해 담당 의료진에게 알려주세요.

처방약의 부정적인 부작용은 **FDA에 보고하는 것이 좋습니다.**

**[www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch)에 방문하거나 1-800-FDA-1088로 전화하십시오. 또한**

**[gsk.public.reportum.com](http://gsk.public.reportum.com) 또는 1-888-825-5249로 GSK에 부정적인 부작용을 보고할 수도 있습니다.**



BLNREP에 대한 박스형 경고 및 투약 안내서를 포함하여 전체 처방 정보를 보려면 클릭하십시오.

# GSK는 귀하의 가정으로 점안액을 배송하여 치료 여정을 지원합니다



아래 링크를 클릭하여 **BLENREP** 점안액 프로그램에 등록하고 무방부제 유통  
점안액을 받기 시작하십시오.



**저희가 도와드리겠습니다!**

다음으로 점안액 프로그램에 연락할 수 있습니다.

**1-844-4GSK-ONC** (1-844-447-5662)

월요일-금요일 오전 8:00 - 오후 8:00 ET

또는 [togetherwithBLENREP.com](https://togetherwithBLENREP.com) 을 방문하십시오.

중요한 안전성 정보 전체를 참조하십시오.

**BLENREP에 대한 박스형 경고 및 투약 안내서를 포함하여 전체  
처방 정보를 보려면 클릭하십시오.**

Please see full [Prescribing Information](#), including Boxed Warning and [Medication Guide](#) for BLENREP.

상표는 GSK 그룹사가 소유하거나 라이선스를 취득한 것입니다.



©2026 GSK or licensor.  
PMUS-BLMLBND260004 February 2026  
Produced in USA.

파일 이름: 점안액 프로그램



**BLENREP**  
belantamab  
mafodotin-blmf  
for injection 70 mg