



BLENREP

滴眼液计划

本宣传册向您介绍 **BLENREP** 滴眼液计划的关键信息，该计划为接受 **BLENREP** 治疗的患者免费提供滴眼液。

获批适应症

BLENREP 是一种处方药，与硼替佐米和地塞米松联合用于治疗多发性骨髓瘤的成人患者，这些患者：

- 已接受至少两种既往治疗，包括一个蛋白酶体抑制剂和一个免疫调节剂，且
- 其疾病已复发或对既往治疗无反应

尚不清楚 **BLENREP** 在儿童中的安全性和有效性。

重要安全性信息

关于 **BLENREP**，我最需要知道的重要信息是什么？

BLENREP 可导致严重副作用，包括：

- **眼部问题。** **BLENREP** 常见的眼部问题，且可能严重。**BLENREP** 可引起眼表改变，导致眼部问题的症状，包括：
 - 视力下降
 - 干眼症
 - 有异物感
 - 眼刺激
 - 视力模糊
 - 眼睛
 - 对光敏感
 - 眼痛

请参阅全文中的其他重要安全信息。点击查看完整处方信息，包括加框警告以及 **BLENREP** 的用药指南。



BLENREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

加入 BLENREP 滴眼液计划



滴眼液计划通过在治疗期间为您寄送滴眼液来支持您。

自您首次接受 BLENREP 输注开始，您需要每天至少使用 4 次无防腐剂润滑型滴眼液，或遵医嘱使用。这些滴眼液是您治疗计划中的重要组成部分，滴眼液计划是我们在您治疗过程中为您提供支持的一种方式。只要您仍在接受治疗，滴眼液将持续直接寄送至您的家中。

BLENREP 的重要安全性信息（续）

关于 BLENREP，我最需要知道的重要信息是什么？（续）
BLENREP 可导致严重副作用，包括：

在使用 BLENREP 治疗期间，眼表可能出现溃疡（角膜溃疡），其中包括伴随感染的情况。

如您在 BLENREP 治疗期间出现任何新的或加重的眼部症状或视力变化，请立即告知您的医务人员。

您的医务人员将转诊至眼科专业人员（如眼科医师或验光师），在开始 BLENREP 治疗前、每次给药前，以及必要时对新的或加重的眼部问题进行检查。您务必做到：

- 按时参加所有眼科就诊，因为一些眼部变化可能无症状，仅能在检查中发现
- 除非由眼科专业人员指示，否则在接受 BLENREP 治疗期间请避免佩戴隐形眼镜
- 从第一次输注开始并持续至治疗结束，每日至少使用无防腐剂人工泪液 4 次
- 在驾驶或操作机械时保持谨慎，因为 BLENREP 可能影响视力

常见问题

资格条件

- 问** 我如何确认自己是否符合加入滴眼液计划的资格？
- 当您的医生为您开具 BLENREP 处方时，时，您您需要加入组 BLENREP 风险评估和缓解策略（REMS）计划
 - 您必须为美国居民（包括哥伦比亚特区、波多黎各以及美属维尔京群岛）
 - 为您开具 BLENREP 处方的医生也必须是美国居民
 - 如果您需要滴眼液，可在 Together with BLENREP 加入表中勾选相应选项以加入滴眼液计划。无需加入 Together with BLENREP 也可获得滴眼液


入组

- 问** 我该如何加入该计划？
- 如需加入，您与您的医生应共同填写 Together with BLENREP 加入表中的相关部分。在填写 Together with BLENREP 官网提供的表格时，请务必勾选滴眼液计划对应的选项框。
- 问** 完成加入后，我将如何收到滴眼液？
- 在您完成加入后，滴眼液计划将与您联系。滴眼液计划将确认寄送地址，确保滴眼液直接寄送至您的家中。

BLENREP 的重要安全性信息（续）

由于眼部问题的风险，BLENREP 仅通过名为 BLENREP 风险评估和缓解策略（REMS）的限制性项目供应。您的医务人员会向您提供 BLENREP REMS 患者指南，介绍眼部风险，并解释 REMS 项目要求。要接受 BLENREP，您必须加入 REMS 项目并在治疗期间进行眼科检查。请参见“BLENREP 的可能副作用有哪些？”以了解有关副作用的更多信息。

请参阅全文中的其他重要安全信息。点击查看完整处方信息，包括加框警告以及 BLENREP 的用药指南。



常见问题（续）



关于滴眼液

- 问** 我可以自行选择滴眼液品牌吗？

如果您愿意，可以使用其他滴眼液；但这些不包含在免费提供的计划中。如果您自行购买滴眼液，请务必选择无防腐剂的滴眼液。您应遵循眼科医疗专业人员的建议。BLENREP 不认可任何特定品牌。
- 问** 谁可以解答有关滴眼液计划或无防腐剂滴眼液的问题？

如有任何问题，您可以联系滴眼液计划。他们将为您提供帮助。请致电 1-844-4GSK-ONC (1-844-447-5662)，服务时间为周一至周五，东部时间上午 8:00 至晚上 8:00。
- 问** 我的滴眼液可以使用多久？

在我们确认您的 BLENREP 处方及 REMS 加入后，您将收到首批寄送的 60 支装滴眼液。滴眼液将寄送至您的地址。

在确认您持续使用 BLENREP 且已完成 REMS 项目加入后，在接下来的 2 个月期间内，您将每 50 天收到一次额外的 60 支装滴眼液。该安排将持续至您停止治疗或选择退出该计划。滴眼液计划将在第 47 天进行一次检查，用以确认您仍处于治疗过程中。

BLENREP 的重要安全性信息（续）

BLENREP 的可能副作用有哪些？
BLENREP 可导致严重副作用，包括：

- 请参见“关于 BLENREP，我最需要知道的重要信息是什么？”中的“眼部问题”
- **血小板减少（血小板减少症）**是 BLENREP 的常见副作用，且可能严重。血小板是一种帮助血液凝固的血细胞。您的医务人员将在 BLENREP 治疗前及必要时在治疗期间检查您的血细胞计数。如果在接受 BLENREP 治疗期间出现任何出血或瘀伤，请告知您的医务人员

常见问题（续）

关于滴眼液（续）

- 问** 我应如何存放滴眼液？

滴眼液应在室温下储存。
- 问** 我可以在佩戴隐形眼镜时使用滴眼液吗？

否，在接受 BLENREP 治疗期间，不应佩戴用于矫正视力的隐形眼镜，除非医生另有指示。

成本/保险

- 问** 该计划是否涉及任何费用？

否，对于符合条件的患者而言，该计划不收取任何费用。
- 问** 我是否需要提供保险信息才能参加滴眼液计划？

如果您仅希望参加滴眼液计划，则无需提供任何保险信息。在 Together with BLENREP 加入表中，您只需勾选希望加入的选项，并由您本人及您的医生签名即可。

BLENREP 的重要安全性信息（续）

BLENREP 联合硼替佐米和地塞米松给药时的最常见副作用包括：


- 请参阅“关于 BLENREP，我最需要知道的重要信息是什么？”中的“眼部问题”
- 上呼吸道感染
- 肝脏问题

- 腹泻
- 疲倦
- 肺炎
- 白内障
- 新冠肺炎

BLENREP 治疗期间最常见的严重异常化验结果包括：
血小板、白细胞和血红蛋白下降，以及某些肝酶升高。

如出现任何新的或加重的原因不明的肺部症状（如呼吸急促、胸痛或咳嗽），请立即告知您的医务人员。

请参阅全文中的其他重要安全信息。点击查看完整处方信息，包括加框警告以及 BLENREP 的用药指南。



BLENREP 的重要安全性信息

关于 **BLENREP**，我最需要知道的重要信息是什么？

BLENREP 可导致严重副作用，包括：

- **眼部问题。**BLENREP 常见的眼部问题，且可能严重。BLENREP 可引起眼表改变，导致眼部问题的症状，包括：
 - 视力下降
 - 视物模糊
 - 眼干
 - 对光敏感
 - 感觉眼睛里像有异物
 - 眼刺激
 - 眼痛

在使用 BLENREP 治疗期间，眼表可能出现溃疡（角膜溃疡），其中包括伴随感染的情况。

如您在 **BLENREP** 治疗期间出现任何新的或加重眼部症状或视力变化，请立即告知您的医务人员。

您的医务人员将转诊至眼科专业人员（如眼科医师或验光师），在开始 BLENREP 治疗前、每次给药前，以及必要时对新的或加重眼部问题进行检查。**您务必做到：**

- 按时参加所有眼科就诊，因为一些眼部变化可能无症状，仅能在检查中发现
- 从第一次输注开始并持续至治疗结束，每日至少使用无防腐剂人工泪液 4 次
- 除非由眼科专业人员指示，否则在接受 BLENREP 治疗期间请避免佩戴隐形眼镜。
- 在驾驶或操作机械时保持谨慎，因为 BLENREP 可能影响视力

由于眼部问题的风险，**BLENREP** 仅通过名为 **BLENREP 风险评估和缓解策略（REMS）的限制性项目供应**。您的医务人员会向您提供 BLENREP REMS 患者指南，介绍眼部风险，并解释 REMS 项目要求。要接受 BLENREP，您必须加入 REMS 项目并在治疗期间进行眼科检查。请参见“**BLENREP 的可能副作用有哪些？**”以了解有关副作用的更多信息。

BLENREP 的可能副作用有哪些？

BLENREP 可导致严重副作用，包括：

- 请参见“关于 **BLENREP**，我最需要知道的重要信息是什么？”中的“眼部问题”
- **血小板减少（血小板减少症）**是 BLENREP 的常见副作用，且可能严重。血小板是一种帮助血液凝固的血细胞。您的医务人员将在 BLENREP 治疗前及必要时在治疗期间检查您的血细胞计数。如果您在接受 BLENREP 治疗期间出现任何出血或瘀青，请告知您的医务人员

BLENREP 联合硼替佐米和地塞米松给药时的最常见副作用包括：

- 请参阅“关于 **BLENREP**，我最需要知道的重要信息是什么？”中的“眼部问题”
- 上呼吸道感染
- 肝脏问题
- 腹泻
- 疲倦
- 肺炎
- 白内障
- 新冠肺炎

BLENREP 治疗期间最常见的严重异常化验结果包括：血小板、白细胞和血红蛋白下降，以及某些肝酶升高。

如出现任何新的或加重原因不明的肺部症状（如呼吸急促、胸痛或咳嗽），请立即告知您的医务人员。

如出现严重副作用，您的医务人员可能会降低剂量、暂时停药或完全停药。

BLENREP 可能会影响男性和女性的生育能力，从而影响您生育子女的能力。如对此有担忧，请与医务人员沟通。

上述并非 BLENREP 所有可能副作用。

如需医疗建议，请联系您的医生。您可以拨打 **1-800-FDA-1088** 向 **FDA** 报告副作用。


接受 BLENREP 前，请告知您的医务人员以下情况：

- 有或曾经有视力或眼部问题
- 有或曾经有出血问题
- 已怀孕或计划怀孕。BLENREP 可伤害未出生的胎儿
- **具有生育潜能的女性：**
 - 在您开始 BLENREP 治疗前，您的医务人员将进行妊娠检测
 - 在接受 BLENREP 治疗期间及最后一次给药后 4 个月内使用有效的避孕措施。请与医务人员讨论期间可使用的避孕方法
 - 如果在 BLENREP 治疗期间怀孕或怀疑怀孕，请立即告知医务人员。
- **具有生育潜能的女性伴侣的男性：**
 - 在 BLENREP 治疗期间及最后一次给药后 6 个月内使用有效避孕措施
- 正在哺乳或计划哺乳。目前尚不清楚 BLENREP 是否会进入乳汁。在 BLENREP 治疗期间及最后一次给药后 3 个月内不要哺乳

请将您使用的所有药物都告知医务人员，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。

我们鼓励您向 **FDA** 报告处方药的不良反应。

请访问 www.fda.gov/medwatch 或致电 **1-800-FDA-1088**。您也可以向 **GSK** 报告不良反应，网址为 gsk.public.reportum.com，或致电 **1-888-825-5249**。



请点击查看完整处方信息，包括加框警告以及 **BLENREP** 的用药指南。

GSK 通过将滴眼液寄送至您家中，在您的治疗过程中为您提供支持。



请点击下方链接登记加入 **BLENREP** 滴眼液计划，开始接收无防腐剂润滑型滴眼液。



我们在此为您提供帮助！

您可以通过以下方式联系滴眼液计划：请致电
1-844-4GSK-ONC (1-844-447-5662)

服务时间是周一至周五上午 8:00 至晚上 8:00 (美国东部时间) 或者访问 togetherwithBLENREP.com

请参阅全文中的重要安全信息。
点击查看完整处方信息，包括加框警告以及
BLENREP 的用药指南。

Please see full [Prescribing Information](#), including Boxed Warning and [Medication Guide](#) for BLENREP.

商标由 GSK 集团公司拥有或授权使用。



©2026 GSK or licensor.
PMUS-BLMLBND260003 February 2026
Produced in USA.

文件名：滴眼液计划



BLENREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg