



BLENREP

眼藥水計畫

本手冊為您提供有關 BLENREP 眼藥水計畫的關鍵資訊，該計畫旨在為接受 BLENREP 治療的患者免費提供眼藥水。

核准用途

BLENREP 是一種處方藥，與硼替佐米和地塞米松藥物併用，用於治療符合下列條件的多發性骨髓瘤成人患者：

- 曾接受至少 2 種治療，包括一種蛋白酶體抑制劑和一種免疫調節劑，以及
- 癌症復發或對先前治療無反應

目前尚不清楚 BLENREP 對兒童是否安全有效。

重要安全性資訊

關於 BLENREP，我應該知道的最重要資訊是什麼？

BLENREP 可引起嚴重副作用，包括：

- **眼部問題。**使用 BLENREP 經常出現眼部問題，也可能很嚴重。BLENREP 可導致眼表出現變化，進而導致眼部問題的症狀，包括：

- | | | | |
|--------|----------|------------|--------|
| - 視力減退 | - 乾眼 | - 感覺眼睛裡有東西 | - 眼部刺激 |
| - 視力模糊 | - 眼睛對光敏感 | - 眼部疼痛 | |

請參閱全文中的其他重要安全性資訊。按一下以查看完整的處方資訊，包括 BLENREP 的方框警語和用藥指南。



BLENREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

加入 BLENREP 眼藥水計畫



本眼藥水計畫會在治療過程中寄送眼藥水給您，以支持您。

從您第一次輸注 BLENREP 開始，您將需要每天使用不含防腐劑的潤滑眼藥水至少 4 次，或依照醫師指示使用。這些眼藥水是您照護計畫的重要部分，而本眼藥水計畫則是我們在您治療過程中為您提供支援的方式。只要您接受治療，我們便會持續直接將眼藥水寄送至您家中。

BLENREP 的重要安全性資訊（續）

關於 BLENREP，我應該知道的最重要資訊是什麼？（續）

BLENREP 可引起嚴重副作用，包括：

在 BLENREP 治療期間，也可能發生眼部表面潰瘍（角膜潰瘍），包括感染。

如果您在 BLENREP 治療期間發現任何新出現或惡化的眼部症狀或視力變化，請立即告知您的健康照護者。

在您開始治療前、您接受每劑 BLENREP 之前，以及因任何新的或惡化的眼部問題而有需要時，您的健康照護者會將您轉介至眼部照護專業人員（例如眼科醫師或驗光師），以檢查您的眼部。**請您務必：**

- 出席您的所有眼科護理約診，因為某些變化發生時可能沒有症狀，且只能在眼科檢查中觀察到
- 除非您的眼科保健專家指示，否則在 BLENREP 治療期間請避免配戴隱形眼鏡
- 從您第一次輸注開始，每天使用至少 4 次不含防腐劑的人工淚液，並持續至 BLENREP 治療結束
- 駕駛或操作機械時請謹慎，因為 BLENREP 可能導致視力改變

常見問題

資格

問：我如何知道自己是否符合眼藥水計畫的資格？

- 當醫師開立 BLENREP 時，您將需要納入 BLENREP 風險評估和緩解策略 (Risk Evaluation and Mitigation Strategy, REMS) 計畫
- 您必須是美國居民（包括 District of Columbia、Puerto Rico 和 US Virgin Islands）
- 開立 BLENREP 處方的醫師也必須是美國居民
- 如果您想要使用眼藥水，您可以勾選 Together with BLENREP 納入表上的方格，以納入眼藥水計畫。納入 Together with BLENREP 並非獲得眼藥水的條件

納入

問：我如何納入本計畫？

如欲納入，您和您的醫師應填寫 Together with BLENREP 納入表的適用部分。當您填寫 Together with BLENREP 網站可提供的表單時，請務必在眼藥水計畫旁的方框中標記。


問：納入後，我將如何獲得眼藥水？

在您納入後，眼藥水計畫將與您聯絡。本眼藥水計畫將確認應將眼藥水寄送至何處，以便直接寄送至您家中。

BLENREP 的重要安全性資訊（續）

由於有眼部問題的風險，**BLENREP 僅可透過稱為 BLENREP 風險評估與緩解策略 (REMS) 的限制計畫取得。**您的健康照護者將為您提供 BLENREP REMS 患者指南，其中描述眼睛問題的風險，並向您解釋 REMS 計劃。若要接受 BLENREP，您必須參與 REMS 計畫，並在治療期間接受眼部檢查。參見「BLENREP 有哪些可能的副作用？」以取得更多關於副作用的資訊。

請參閱全文中的其他重要安全性資訊。按一下以查看完整的處方資訊，包括 BLENREP 的方框警語和用藥指南。





關於眼藥水

問：我可以選擇自己的眼藥水品牌嗎？

如果您想要的話，可以使用其他眼藥水；但是，它們不會成為免費計畫的一部分。如果您購買自己的眼藥水，請務必選擇不含防腐劑的眼藥水。您應遵循您眼部照護專業人員的建議。BLENREP 不認可任何特定品牌。

問：誰可以回答有關眼藥水計畫
或不含防腐劑眼藥水的問題？

如有任何疑問，您可以聯絡眼藥水計畫。他們會提供協助。請致電 1-844-4GSK-ONC (1-844-447-5662) 聯絡他們，服務時間為週一至週五，美國東部時間上午 8:00 至晚上 8:00。

問：我的眼藥水可供使用多久？

在我們確認您的 BLENREP 處方及 REMS 納入後，您將收到首批貨件，包含 60 支眼藥水小瓶。眼藥水將寄送到您的地址。

在您繼續使用 BLENREP 且確認納入 REMS 後，在接下來的 2 個月期間，您將每 50 天額外獲得一次 60 支小瓶的眼藥水。這將持續至您停止治療或選擇退出計畫為止。眼藥水計畫將在第 47 天檢查，以確認您仍在接受治療。

BLENREP 的重要安全性資訊（續）

BLENREP 有哪些可能的副作用？

BLENREP 可引起嚴重副作用，包括：

- 參見「關於 BLENREP，我最需要了解的重要資訊是什麼？」中的「眼部問題」
- 血小板減少（血小板減少症）常見於 BLENREP，也可能很嚴重。血小板是一種幫助血液凝結的血球。在您開始接受 BLENREP 治療之前，以及視需要在治療期間，您的健康照護者將檢查您的血球計數。如果您在 BLENREP 治療期間發生任何出血或瘀血，請告知您的健康照護者

關於眼藥水（續）

問：我應該如何儲存眼藥水？

眼藥水應儲存於室溫下。

問：我可以將眼藥水與隱形眼鏡一起使用嗎？

否，除非您的醫師指示，否則在使用 BLENREP 期間不應配戴矯正視力的隱形眼鏡。

費用／保險

問：計畫是否有任何相關費用？

否，針對符合資格的患者，此計畫無相關費用。

問：我是否需要提供保險資訊才能參與眼藥水計畫？

否，如果您只想參與眼藥水計畫，則無需提供任何保險資訊。在 Together with BLENREP 納入表中，您只需要在納入表中勾選您想納入的方格，並提供您和您醫師的簽名。

BLENREP 的重要安全性資訊（續）


BLENREP 與 bortezomib 和 dexamethasone 併用時最常見的副作用包括：

- 參見「關於 BLENREP，我最需要了解的重要資訊是什麼？」中的「眼部問題」
- 上呼吸道感染
- 肝臟問題
- 腹瀉
- 疲倦
- 肺炎
- 白內障
- COVID-19

BLENREP 治療期間最常見的嚴重血液檢測結果異常包括血小板、白血球和血紅素減少，以及特定肝臟酵素增加。

如果您出現新的或惡化的肺部問題原因不明徵象或症狀，包括呼吸短促、胸痛或咳嗽，請立即告知您的健康照護者。

請參閱全文中的其他重要安全性資訊。按一下以查看完整的處方資訊，包括 BLENREP 的方框警語和用藥指南。



BLENREP 的重要安全性資訊

關於 **BLENREP**，我應該知道的最重要資訊是什麼？

BLENREP 可引起嚴重副作用，包括：

- **眼部問題。**使用 **BLENREP** 經常出現眼部問題，也可能很嚴重。**BLENREP** 可導致眼表出現變化，進而導致眼部問題的症狀，包括：
 - 視力減退
 - 視力模糊
 - 眼部乾燥
 - 對光敏感
 - 感覺眼睛裡有東西
 - 眼部刺激
 - 眼部疼痛

在 **BLENREP** 治療期間，也可能發生眼部表面潰瘍（角膜潰瘍），包括感染。

如果您在 **BLENREP** 治療期間發現任何新出現或惡化的眼部症狀或視力變化，請立即告知您的健康照護者。

在您開始治療前、您接受每劑 **BLENREP** 之前，以及因任何新的或惡化的眼部問題而有需要時，您的健康照護者會將您轉介至眼部照護專業人員（例如眼科醫師或驗光師），以檢查您的眼部。**請您務必：**

- 出席您的所有眼科照護約診，因為某些變化發生時可能沒有症狀，且只能在眼科檢查中觀察到
- 從您第一次輸注開始，每天使用至少 4 次不含防腐劑的人工淚液，並持續至 **BLENREP** 治療結束
- 除非您的眼科保健專家指示，否則在 **BLENREP** 治療期間請避免配戴隱形眼鏡
- 駕駛或操作機械時請謹慎，因為 **BLENREP** 可能導致視力改變

由於有眼部問題的風險，**BLENREP** 僅可透過稱為 **BLENREP 風險評估與緩解策略 (REMS)** 的限制計畫取得。您的健康照護者將為您提供 **BLENREP REMS** 患者指南，其中描述眼睛問題的風險，並向您解釋 **REMS** 計劃。若要接受 **BLENREP**，您必須參與 **REMS** 計畫，並在治療期間接受眼部檢查。參見「**BLENREP** 有哪些可能的副作用？」以取得更多關於副作用的資訊。

BLENREP 有哪些可能的副作用？

BLENREP 可引起嚴重副作用，包括：

- 參見「關於 **BLENREP**，我最需要了解的重要資訊是什麼？」中的「眼部問題」
- **血小板減少（血小板減少症）常見於 **BLENREP**，也可能很嚴重。**血小板是一種幫助血液凝結的血球。在您開始接受 **BLENREP** 治療之前，以及視需要在治療期間，您的健康照護者將檢查您的血球計數。如果您在 **BLENREP** 治療期間發生任何出血或瘀血，請告知您的健康照護者

BLENREP 與 bortezomib 和 dexamethasone 併用時最常見的副作用包括：

- 參見「關於 **BLENREP**，我最需要了解的重要資訊是什麼？」中的「眼部問題」
- 上呼吸道感染
- 肝臟問題
- 腹瀉
- 疲倦
- 肺炎
- 白內障
- COVID-19

BLENREP 治療期間最常見的嚴重血液檢測結果異常包括血小板、白血球和血紅素減少，以及特定肝臟酵素增加。

如果您出現新的或惡化的肺部問題原因不明徵象或症狀，包括呼吸短促、胸痛或咳嗽，請立即告知您的健康照護者。

如果您發生嚴重副作用，健康照護者可能會降低您的劑量、暫時停止或完全停止 **BLENREP** 治療。

BLENREP 可能影響男性和女性的生育能力，進而影響您生育子女的能力。如果這對您造成疑慮，請與您的健康照護者討論。

這些並非 **BLENREP** 的全部可能副作用。


有關副作用的醫療建議，請致電您的醫師。您可致電 1-800-FDA-1088 向美國美國食品藥物管理局 (FDA) 通報副作用。

在接受 **BLENREP 之前，請告知您的健康照護者您的所有醫療狀況，包括您是否：**

- 有或曾經有視力或眼睛問題
- 有或曾經有出血問題
- 已懷孕或計畫懷孕。**BLENREP** 會對您未出生的胎兒造成傷害。
 - 具生育能力女性：**
 - 在您開始接受 **BLENREP** 治療之前，您的健康照護者將進行驗孕
 - 在 **BLENREP** 治療期間及最後一劑後 4 個月內使用有效的避孕措施。請與您的醫療人員討論關於所使用的避孕方式
 - 如果您在 **BLENREP** 治療期間懷孕或認為自己可能懷孕，請告知您的健康照護者
 - 其女性伴侶具生育能力的男性：**
 - 在 **BLENREP** 治療期間和最後一劑後 6 個月內使用有效的避孕方法
- 正在哺乳或計畫要哺乳。尚不清楚 **BLENREP** 是否會進入母乳中。在 **BLENREP** 治療期間及最後一劑後 3 個月內，請勿哺乳

請向您的醫療人員告知您所使用的所有藥物，包括處方藥和非處方藥、維他命和草藥補充劑。

我們鼓勵您向 **FDA** 通報處方藥物的不良副作用。請造訪 www.fda.gov/medwatch 或致電 **1-800-FDA-1088**。您也可以向 **GSK** 報告不良副作用，透過 gsk.public.reportum.com 或 **1-888-825-5249**。



請按一下以查看完整的處方資訊，包括 **BLENREP** 的方框警語和用藥指南。

**GSK 會在您的治療過程中
支持您，並將眼藥水送至
您家中**



請點選下方連結納入 **BLENREP** 眼藥水計畫，並開始接受不含防腐劑的潤滑眼藥水。



我們很樂意給予協助！

請致電 **1-844-4GSK-ONC** (1-844-447-5662)

聯絡眼藥水計畫

服務時間為週一至週五，美國東部時間上午 8:00

至晚上 8:00，或造訪 togetherwithBLENREP.com

請參閱全文中的重要安全性資訊。
按一下以查看完整的處方資訊，包括
BLENREP 的方框警語和用藥指南。

Please see full [Prescribing Information](#), including Boxed Warning and [Medication Guide](#) for BLENREP.

商標由 GSK 集團公司擁有或授權給 GSK 集團。

GSK

©2026 GSK or licensor.
PMUS-BLMLBND260002 February 2026
Produced in USA.

檔案名稱：眼藥水計畫



BLENREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg