

진료팀과의 협력



이 안내서는 귀하의 진료팀에 속할 수 있는 다양한 개인들을 소개해 드립니다. 이 지원 네트워크에는 치료 여정 내내 귀하와 협력할 간호사, 종양전문의, 안과전문의, 검안사가 포함됩니다.

승인된 용도

BLNREP은 다음과 같은 다발성 골수종이 있는 성인을 치료하기 위해 보르테조미드 및 덱사메타손 약물과 병용하여 사용되는 처방약입니다.

- 프로테아좀 억제제 및 면역조절제를 포함하여 이전에 최소 2회의 치료를 받은 경우, 그리고
- 암이 재발했거나 이전 치료에 반응하지 않은 경우

BLNREP이 소아에서 안전하고 효과적인지 여부는 알려져 있지 않습니다.

중요한 안전성 정보

BLNREP에 대해 알아야 할 가장 중요한 정보는 무엇입니까?

BLNREP은 다음을 포함한 중대한 부작용을 유발할 수 있습니다.

- **눈 문제.** 눈 문제는 BLNREP에서 흔하며 또한 중증일 수 있습니다. BLNREP은 눈 표면의 변화를 유발할 수 있으며, 이는 다음을 포함한 눈 문제의 증상으로 이어질 수 있습니다.

- | | | | |
|---------|-------------|----------------|--------|
| - 시력 감소 | - 안구 건조 | - 눈에 무언가가 있는 것 | - 눈 자극 |
| - 흐린 시야 | - 빛에 대한 민감성 | 같은 느낌 | - 눈 통증 |

추가적인 중요한 안전성 정보 전체를 참조하십시오.
BLNREP에 대한 박스형 경고 및 투약 안내서를
포함하여 전체 처방 정보를 보려면 클릭하십시오.



BLNREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

진료팀 만나기

귀하의 종양전문의가 귀하의 치료를 감독하는 주요 인물이지만, 치료 여정을 돕기 위해 귀하와 담당 의사와 협력하는 전문의로 구성된 전체 팀이 있습니다.



BLNREP 여정 동안 다음 사람들이 진료팀의 일원이 될 수 있습니다



종양학 간호사


암 치료를 전문으로 합니다. 종양학 간호사는 다발성골수종 교육을 제공하고 종양학 전문의와 치료 계획을 조율할 수 있습니다. 또한 부작용과 투여 중 예상되는 사항에 대해 알려드릴 수 있습니다.



안과전문의 및 검안사

각 BLNREP 투여 전에 눈 검사를 실시합니다. 또한 새로운 증상이나 악화된 증상에 대해 또는 담당 의사가 권장하는 바에 따라 추가 눈 검사가 필요할 것입니다. 필요한 눈 검사를 위해 이러한 눈 관리 전문가를 방문할 수 있습니다.

BLNREP 여정 동안 다음 사람들이 진료팀의 일원이 될 수 있습니다(계속)



혈액전문의 및 혈액학 간호사

다발성골수종과 같은 혈액암을 전문으로 합니다. 종양전문의와 긴밀히 협력하여 치료를 관리하고 실험실 결과를 모니터링하는 데 도움을 줍니다.



주입 간호사

항암화학요법 및 면역요법과 같은 정맥 내(IV) 치료제를 투여합니다. 이들은 BLNREP 투여를 실시하는 사람들입니다. 주입 간호사가 부작용을 모니터링하고 주입 중 안전성을 보장할 것입니다.

BLNREP의 중요한 안전성 정보(계속)

BLNREP 투여 기간 동안 감염을 포함한 눈 표면의 궤양(각막 궤양)이 발생할 수도 있습니다.

BLNREP 투여 기간 동안 새로운 눈 증상이나 악화된 눈 증상 또는 시력 변화를 발견하는 경우, **즉시 담당 의료진에게 알리십시오.**

담당 의료진이 투여를 시작하기 전, 각 BLNREP 용량을 투여받기 전, 그리고 일체의 새로운 눈 문제나 악화된 눈 문제에 대해 필요에 따라 눈을 검사하기 위해 귀하를 안과 전문가(예: 안과전문의 또는 검안사)에게 의뢰할 것입니다. **다음을 수행하는 것이 중요합니다.**

- 일부 변화는 증상 없이 발생할 수 있고 눈 검사에서만 관찰될 수 있으므로 모든 눈관리 예약 일정을 지킵니다
- 첫 주입부터 시작하여 BLNREP 투여 종료 시까지 하루에 최소 4회 무방부제 인공눈물을 사용합니다
- 안과 전문의의 지시가 없는 한, BLNREP 치료 기간 동안 콘택트 렌즈 착용을 피합니다
- BLNREP은 시력을 변화시킬 수 있으므로 운전 또는 기계 조작 시 주의합니다

BLNREP의 중요한 안전성 정보(계속)

눈 문제의 위험으로 인해, **BLNREP은 BLNREP 위험 평가 및 완화 전략(REMS)이라는 제한된 프로그램을 통해서만 이용할 수 있습니다.**

담당 의료진이 눈 문제의 위험을 설명하는 BLNREP REMS 환자 안내서를 제공하고 REMS 프로그램에 대해 설명해 드릴 것입니다. BLNREP을 투여받기 위해서는 REMS 프로그램에 등록하고 투여 기간 동안 눈 검사를 받아야 합니다. 부작용에 대한 자세한 정보는 **“BLNREP의 가능한 부작용은 무엇입니까?”**를 참조하십시오.

추가적인 중요한 안전성 정보 전체를 참조하십시오. BLNREP에 대한 박스형 경고 및 투약 안내서를 포함하여 전체 처방 정보를 보려면 클릭하십시오.

BLNREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

진료팀 대화 탐색

진료팀과 건설적인 대화를 나누면 진료팀이 귀하의 생각을 이해하고 귀하의 요구에 가장 적절하게 대응하는 데 도움이 될 수 있습니다. 상의를 위한 팁과 가능한 주제는 아래를 참조하십시오.



진료팀과 건설적인 대화를 나누기 위한 팁



전체적인 상황을 설명합니다

- 진료팀이 귀하의 경험을 완전히 이해할 수 있도록 개방적인 자세를 취하는 것이 중요합니다. 이는 귀하의 치료를 더 잘 관리하는 데 도움이 됩니다. 부작용을 경험하는 경우, 이를 진료팀과 공유해야 합니다



방문 사이에 귀하의 상태를 추적합니다

- 지난 몇 주 동안 일어난 일을 기억하기 어려울 수 있습니다. 전체 투여 기간 동안 잠시 시간을 내어 매일 어떤 기분이 드는지 기록한 후 예약 방문 시 지참하십시오



도움을 줄 사람을 동행합니다

- 필요한 경우 지원을 받고 귀하를 대변해 줄 수 있도록 친구나 사랑하는 사람이 진료 예약에 동행하는 것을 고려합니다

진료팀과 건설적인 대화를 나누기 위한 팁(계속)



귀하에게 중요한 것을 공유하십시오

- 진료 계획을 귀하의 목표 및 귀하에게 중요한 다른 모든 것에 맞게 조정할 수 있도록 귀하의 진료팀과 상의하십시오. 목표가 변경되면 이를 업데이트하고 의사 및 간호사와 공유할 수 있습니다
- 다음 예약 전에 진료팀에게 물어볼 질문 목록도 만들 수 있습니다



필요한 정보를 받을 수 있도록 스스로를 대변합니다

- 진료팀과 함께 있을 때, 이해가 안 되는 부분이 있으면 주저하지 말고 질문하여 필요한 정보를 얻으십시오. 귀하가 얘기할 때까지 진료팀은 귀하가 어떻게 느끼는지 알지 못할 수 있습니다
- 또한, BLENREP을 복용하는 사람들을 위해 BLENREP 제조사가 제공하는 지원 프로그램인 Together with BLENREP에 등록하는 것에 대해 진료팀에 문의하십시오. 자세한 내용은 뒷면 커버를 참조하십시오

이 목록은 BLENREP 치료 여정에서 보게 될 모든 사람을 포함하는 것은 아닐 수 있다는 점을 명심하십시오.



BLENREP의 중요한 안전성 정보(계속)

BLENREP의 가능한 부작용은 무엇입니까?

BLENREP은 다음을 포함한 중대한 부작용을 유발할 수 있습니다.

- “BLENREP에 대해 알아야 할 가장 중요한 정보는 무엇입니까?”의 “눈 문제”를 참조하십시오.
- 혈소판 감소(혈소판감소증)는 BLENREP에서 흔하며 중증일 수도 있습니다. 혈소판은 혈액 응고를 돕는 혈액 세포의 한 종류입니다. 담당 의료진이 귀하가 BLENREP 투여를 시작하기 전과 필요에 따라 투여 기간 동안 혈액 세포 수를 확인할 것입니다. BLENREP 투여 기간 동안 출혈 또는 멍이 발생하는 경우 담당 의료진에게 알려십시오

BLENREP의 중요한 안전성 정보(계속)

보르테조미 및 덱사메타손과 병용 투여 시 BLENREP의 가장 흔한 부작용은 다음과 같습니다.

- “BLENREP에 대해 알아야 할 가장 중요한 정보는 무엇입니까?”의 “눈 문제”를 참조하십시오.
- 상기도 감염
- 간 문제
- 설사
- 피로감
- 폐렴
- 백내장
- COVID-19

추가적인 중요한 안전성 정보 전체를 참조하십시오. BLENREP에 대한 박스형 경고 및 투약 안내서를 포함하여 전체 처방 정보를 보려면 클릭하십시오.

BLENREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

BLNREP의 중요한 안전성 정보

BLNREP에 대해 알아야 할 가장 중요한 정보는 무엇입니까?

BLNREP은 다음을 포함한 중대한 부작용을 유발할 수 있습니다.

- 눈 문제. 눈 문제는 BLNREP에서 흔하며 또한 중증일 수 있습니다. BLNREP은 눈 표면의 변화를 유발할 수 있으며, 이는 다음을 포함한 눈 문제의 증상으로 이어질 수 있습니다.
 - 시력 감소
 - 눈에 무언가가 있는 것 같은 느낌
 - 흐린 시야
 - 눈 자극
 - 안구 건조
 - 눈 통증
 - 빛에 대한 민감성

BLNREP 투여 기간 동안 감염을 포함한 눈 표면의 궤양(각막 궤양)이 발생할 수도 있습니다.

BLNREP 투여 기간 동안 새로운 눈 증상이나 악화된 눈 증상 또는 시력 변화를 발견하는 경우, 즉시 담당 의료진에게 알려주세요.

담당 의료진이 투여를 시작하기 전, 각 BLNREP 용량을 투여받기 전, 그리고 일체의 새로운 또는 악화된 눈 문제에 대해 필요에 따라 눈을 검사하기 위해 귀하를 안과 전문가(예: 안과전문의 또는 검안사)에게 의뢰할 것입니다.

다음은 수행하는 것이 중요합니다.

- 일부 변화는 증상 없이 발생할 수 있고 눈 검사에서만 관찰될 수 있으므로 모든 눈관리 예약 일정을 지킵니다
- 첫 주입부터 시작하여 BLNREP 투여 종료 시까지 하루에 최소 4회 무방부제 인공눈물을 사용합니다
- 안과 전문의의 지시가 없는 한, BLNREP 치료 기간 동안 콘택트 렌즈 착용을 피합니다
- BLNREP은 시력을 변화시킬 수 있으므로 운전 또는 기계 조작 시 주의합니다

눈 문제의 위험으로 인해, BLNREP은 BLNREP 위험 평가 및 완화 전략(REMS)이라는 제한된 프로그램을 통해서만 이용할 수 있습니다. 담당 의료진이 눈 문제의 위험을 설명하는 BLNREP REMS 환자 안내서를 제공하고 REMS 프로그램에 대해 설명해 드릴 것입니다. BLNREP을 투여받기 위해서는 REMS 프로그램에 등록하고 투여 기간 동안 눈 검사를 받아야 합니다. 부작용에 대한 자세한 정보는 “BLNREP의 가능한 부작용은 무엇입니까?”를 참조하십시오.

BLNREP의 가능한 부작용은 무엇입니까?

BLNREP은 다음을 포함한 중대한 부작용을 유발할 수 있습니다.

- “BLNREP에 대해 알아야 할 가장 중요한 정보는 무엇입니까?”의 “눈 문제”를 참조하십시오
- 혈소판 감소(혈소판감소증)는 BLNREP에서 흔하며 중증일 수도 있습니다. 혈소판은 혈액 응고를 돕는 혈액 세포의 한 종류입니다. 담당 의료진이 귀하가 BLNREP 투여를 시작하기 전과 필요에 따라 투여 기간 동안 혈액 세포 수를 확인할 것입니다. BLNREP 투여 기간 동안 출혈 또는 멍이 발생하는 경우 담당 의료진에게 알려주세요

보르테조미 및 덱사메타손과 병용 투여 시 BLNREP의 가장 흔한 부작용은 다음과 같습니다.

- “BLNREP에 대해 알아야 할 가장 중요한 정보는 무엇입니까?”의 “눈 문제”를 참조하십시오.
- 피로감
- 폐렴
- 상기도 감염
- 백내장
- 간 문제
- COVID-19
- 설사

BLNREP 투여 기간 동안 가장 흔한 중증 혈액 검사 이상 결과에는 혈소판, 백혈구, 헤모글로빈 감소, 특정 간 효소 증가가 포함됩니다.

숨가쁨, 흉통 또는 기침을 포함해 폐 문제의 새로운 또는 악화된 설명되지 않는 징후 또는 증상이 발생하는 경우, 즉시 담당 의료진에게 알려주세요.

귀하가 중대한 부작용을 경험하는 경우, 담당 의료진이 BLNREP 용량을 감량하거나, BLNREP 투여를 일시적으로 중단하거나, 완전히 중단할 수 있습니다.

BLNREP은 남성과 여성의 생식력에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 귀하의 가임 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 이것이 우려되는 경우 담당 의료진과 상의하십시오.

이는 BLNREP의 가능한 모든 부작용이 아닙니다.


부작용에 대한 의학적 조언을 구하려면 담당 의사에게 전화하십시오. 1-800-FDA-1088로 FDA에 부작용을 보고할 수 있습니다.

BLNREP을 투여받기 전, 다음과 같은 경우를 포함한 모든 의학적 상태에 관해 담당 의료진에게 알려주세요.

- 시력 또는 눈 문제가 있거나 있었던 경우
- 출혈 문제가 있거나 있었던 경우
- 임신 중이거나 임신을 계획하고 있는 경우. BLNREP은 태아에게 해를 끼칠 수 있습니다
- 가임 여성:
 - 귀하가 BLNREP 투여를 시작하기 전에 담당 의료진이 임신 검사를 실시할 것입니다
 - BLNREP 투여 기간 동안과 마지막 투여 후 4개월 동안 효과적인 피임법을 사용하십시오. 이 기간 동안 사용할 수 있는 피임법에 대해 담당 의료진과 상의하십시오
 - BLNREP 투여 기간 동안 임신하게 되거나 임신했을 수 있다고 생각하는 경우, 담당 의료진에게 알려주세요
- 가임 여성 파트너가 있는 남성:
 - BLNREP 투여 기간 동안과 마지막 투여 후 6개월 동안 효과적인 피임법을 사용하십시오
- 모유 수유 중이거나 모유 수유를 계획하고 있는 경우. BLNREP이 모유로 분비되는지 여부는 알려져 있지 않습니다. BLNREP 투여 기간 동안과 마지막 투여 후 3개월 동안 모유 수유를 하지 마십시오

처방약 및 일반의약품, 비타민, 생약 보충제를 포함하여 귀하가 복용하는 모든 약물에 대해 담당 의료진에게 알려주세요.

처방약의 부정적인 부작용은 FDA에 보고하는 것이 좋습니다. www.fda.gov/medwatch에 방문하거나 1-800-FDA-1088로 전화하십시오. 또한 gsk.public.reportum.com 또는 1-888-825-5249로 GSK에 부정적인 부작용을 보고할 수도 있습니다.



BLNREP에 대한 박스형 경고 및 투약 안내서를 포함하여 전체 처방 정보를 보려면 클릭하십시오.

Together with BLENREP 에 등록하지 않으셨다면 지금 가입하십시오!



아래 링크를 클릭하여 등록하고 추가 자료,
Nurse Navigators* 등에 액세스하십시오.



저희가 도와드리겠습니다!

다음으로 점안액 프로그램에 연락할 수 있습니다.

1-844-4GSK-ONC (1-844-447-5662)

월요일-금요일 오전 8:00 - 오후 8:00 ET

또는 togetherwithBLENREP.com 을 방문하십시오.

*Nurse Navigators는 의학적 조언을 제공하지 않으며 담당 의사의 치료 팀의 일원이 아닙니다. 귀하의 질병 및 BLENREP 치료에 대해 궁금한 점이 있으면 담당 의사에게 문의하십시오.

중요한 안전성 정보 전체를 참조하십시오.
BLENREP에 대한 박스형 경고 및 투약 안내서를
포함하여 전체 처방 정보를 보려면 클릭하십시오.

**Please see full Prescribing Information, including
Boxed Warning and Medication Guide for BLENREP.**

상표는 GSK 그룹사가 소유하거나 라이선스를 취득한 것입니다.



©2026 GSK or licensor.
PMUS-BLMLBND260011 March 2026
Produced in USA.

파일 이름: 진료팀과의 협력



BLENREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg