

Сотрудничество с вашим лечащим персоналом



В этом руководстве представлена информация о ряде лиц, которые могут входить в состав вашего лечащего персонала. Эта сеть поддержки включает медсестер, онкологов, офтальмологов и оптометристов, которые будут работать с вами на протяжении всего лечения.

Утвержденное использование

BLENREP — это рецептурный препарат, который применяется в комбинации с лекарственными препаратами бортезомиб и дексаметазон для лечения взрослых пациентов с множественной миеломой, которые:

- получили как минимум две предшествующих линии лечения, включая применение ингибитора протеасом и иммуномодулирующего препарата; и
- имеют рецидив рака или отсутствие ответа на предыдущее лечение.

Неизвестно, является ли BLENREP безопасным и эффективным у детей.

Важная информация по безопасности

Какую наиболее важную информацию о BLENREP мне следует знать?

BLENREP может вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе:

- **Проблемы со стороны глаз.** Проблемы со стороны глаз часто возникают при применении BLENREP и могут быть тяжелыми. BLENREP может вызывать изменения поверхности глаза, которые могут привести к симптомам проблем со стороны глаз, в том числе:
 - ухудшение зрения
 - сухость глаз
 - ощущение инородного тела в глазу
 - раздражение глаз
 - боль в глазах
 - нечеткость зрения
 - чувствительность к свету

Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией по безопасности. Нажмите, чтобы увидеть полную инструкцию по применению препарата, включая предупреждение в рамке и руководство для пациентов для препарата BLENREP.



BLENREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

Познакомьтесь со своим лечащим персоналом

Хотя ваш онколог является основным специалистом, курирующим ваше лечение, существует целая команда специалистов, которые совместно с вашим врачом помогают вам пройти все этапы лечения.



Следующие специалисты могут войти в команду вашего лечащего персонала во время лечения BLENREP



Медсестры онкологического отделения

специализируются на лечении онкологических больных. Медсестра онкологического отделения может рассказать вам о множественной миеломе и скоординировать планы лечения с онкологами. Она также может поговорить с вами о побочных эффектах и о том, что будет происходить во время лечения.



Офтальмологи и оптометристы

проводят обследования глаз перед введением каждой дозы BLENREP. При появлении или ухудшении симптомов либо по рекомендации врача также потребуются дополнительные обследования глаз. Вы можете обратиться к любому из этих специалистов по заболеваниям глаз для обследований глаз, которые вам потребуются.

Следующие специалисты могут войти в команду вашего лечащего персонала во время лечения BLENREP (продолжение)



Гематологи и медсестры отделения гематологии

специализируются на злокачественных опухолях крови, таких как множественная миелома. Они тесно сотрудничают с вашим онкологом, помогая организовать лечение и контролировать результаты лабораторных исследований.



Процедурные медсестры

выполняют внутривенное (в/в) введение лекарственных средств, таких как химиотерапевтические и иммунотерапевтические препараты. Именно они будут вводить вам препарат BLENREP. Процедурная медсестра будет наблюдать за побочными эффектами и обеспечивать безопасность во время инфузий.

Важная информация по безопасности препарата BLENREP (продолжение)

Во время лечения препаратом BLENREP также могут возникать язвы на поверхности глаза (язвы роговицы), в том числе с инфекцией.

Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если вы заметите какие-либо новые или усугубившиеся симптомы со стороны глаз или изменения зрения во время лечения препаратом BLENREP.

Ваш лечащий врач направит вас к врачу-офтальмологу (например, офтальмологу или оптометристу) для проверки ваших глаз перед началом лечения, перед введением вам каждой дозы BLENREP, а также по мере необходимости при возникновении новых или усугублении имеющихся проблем с глазами. **Важно, чтобы вы:**

- выполняли все назначенные визиты к врачу-офтальмологу, поскольку некоторые изменения могут происходить без симптомов и могут наблюдаться только при обследовании глаз
- использовали бесконсервантные заменители слезной жидкости не менее 4 раз в день, начиная с первой инфузии и до окончания лечения препаратом BLENREP
- избегали ношения контактных линз во время лечения препаратом BLENREP, если нет прямых указаний врача-офтальмолога
- соблюдали осторожность при управлении транспортными средствами или работе с механизмами, поскольку BLENREP может вызвать изменения зрения

Важная информация по безопасности препарата BLENREP (продолжение)

По причине риска возникновения проблем со стороны глаз BLENREP доступен только через ограниченную программу, называемую стратегией оценки и снижения риска (REMS) BLENREP.

Ваш лечащий врач выдаст вам руководство для пациента BLENREP REMS, в котором описывается риск возникновения проблем со стороны глаз, и расскажет вам о программе REMS. Чтобы получать BLENREP, вы должны быть включены в программу REMS и проходить обследования глаз во время лечения. См. абзац «Каковы возможные побочные эффекты BLENREP?» для получения дополнительной информации о побочных эффектах.

Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией по безопасности. Нажмите, чтобы увидеть полную инструкцию по применению препарата, включая предупреждение в рамке и руководство для пациентов для препарата BLENREP.

 **BLENREP**
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

Навигация по беседам с лечащим персоналом

Конструктивные беседы с вашим лечащим персоналом помогут специалистам понять, что вас беспокоит, и как лучше всего удовлетворить ваши потребности. Ниже приведены советы и возможные темы для обсуждения.



Советы по конструктивным беседам с лечащим персоналом



Предоставьте полную картину

- Важно быть открытым со своим лечащим персоналом, чтобы ваши специалисты полностью понимали ситуацию. Это поможет им лучше организовать ваше лечение. Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, обязательно сообщите об этом своему лечащему персоналу



Фиксируйте свое самочувствие между визитами

- Иногда тяжело вспомнить, что произошло в предыдущие недели. Уделите несколько минут, чтобы ежедневно записывать информацию о своем самочувствии на протяжении всего периода лечения и приносите ее с собой на приемы



Приведите с собой кого-нибудь для поддержки

- Рассмотрите возможность привести с собой на прием друга или близкого человека, который сможет поддержать вас и, при необходимости, представлять ваши интересы

Советы по конструктивным беседам с лечащим персоналом (продолжение)



Расскажите, что для вас важно

- Поговорите со своим лечащим персоналом, чтобы согласовать план лечения с вашими целями и всем остальным, что для вас важно. Вы можете обновлять свои цели по мере их изменения и делиться ими с врачом и медсестрой
- Перед следующим визитом вы также можете составить список вопросов, чтобы задать их своему лечащему персоналу



Отстаивайте свое право на получение необходимой информации

- При встречах со своим лечащим персоналом не стесняйтесь задавать вопросы, если вам что-то непонятно, чтобы получить необходимую информацию. Ваш лечащий персонал может не знать, что вы чувствуете, пока вы не скажете об этом.
- Кроме того, спросите свой лечащий персонал о включении в программу Together with BLENREP — программу поддержки, предлагаемую производителями BLENREP для получающих BLENREP пациентов. Дополнительная информация приведена на задней обложке

Имейте в виду, что этот список может не охватывать всех, с кем вы будете взаимодействовать в ходе лечения BLENREP.



Важная информация по безопасности препарата BLENREP (продолжение)

Каковы возможные побочные эффекты BLENREP?

BLENREP может вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе:

- см. абзац «Проблемы со стороны глаз» в разделе «Какую наиболее важную информацию о BLENREP мне следует знать?»
- снижение количества тромбоцитов (тромбоцитопения) часто наблюдается при применении препарата BLENREP и также может быть тяжелым.** Тромбоциты — это тип клеток крови, которые способствуют свертыванию крови. Перед началом лечения препаратом BLENREP и во время лечения по мере необходимости ваш лечащий врач будет проверять количество клеток крови. Сообщите своему лечащему врачу, если во время лечения BLENREP у вас возникнет кровотечение или кровоподтек.

Важная информация по безопасности препарата BLENREP (продолжение)

Наиболее частые побочные эффекты BLENREP при совместном применении с бортезомибом и дексаметазоном включают:

- см. абзац «Проблемы со стороны глаз» в разделе «Какую наиболее важную информацию о BLENREP мне следует знать?»
- инфекция верхних дыхательных путей
- проблемы со стороны печени
- диарея
- усталость
- пневмония
- катаракта
- COVID-19

Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией по безопасности. Нажмите, чтобы увидеть полную инструкцию по применению препарата, включая предупреждение в рамке и руководство для пациентов для препарата BLENREP.



BLENREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg

Важная информация по безопасности препарата BLENREP

Какую наиболее важную информацию о BLENREP мне следует знать?

BLENREP может вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе:

- **Проблемы со стороны глаз.** Проблемы со стороны глаз часто возникают при применении BLENREP и могут быть тяжелыми. BLENREP может вызывать изменения поверхности глаза, которые могут привести к симптомам проблем со стороны глаз, в том числе:
 - ухудшение зрение
 - ощущение инородного тела в глазу
 - нечеткость зрения
 - раздражение глаз
 - сухость глаз
 - боль в глазах
 - чувствительность к свету.

Во время лечения препаратом BLENREP также могут возникать язвы на поверхности глаза (язвы роговицы), в том числе с инфекцией.

Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если вы заметите какие-либо новые или усугубившиеся симптомы со стороны глаз или изменения зрения во время лечения препаратом BLENREP.

Ваш лечащий врач направит вас к врачу-офтальмологу (например, офтальмологу или оптометристу) для проверки ваших глаз перед началом лечения, перед введением вам каждой дозы BLENREP, а также по мере необходимости при возникновении новых или усугублении имеющихся проблем с глазами. **Важно, чтобы вы:**

- выполняли все назначенные визиты к врачу-офтальмологу, поскольку некоторые изменения могут происходить без симптомов и могут наблюдаться только при обследовании глаз
- использовали бесконсервантные заменители слезной жидкости не менее 4 раз в день, начиная с первой инфузии и до окончания лечения препаратом BLENREP
- избегали ношения контактных линз во время лечения препаратом BLENREP, если нет прямых указаний врача-офтальмолога
- соблюдали осторожность при управлении транспортными средствами или работе с механизмами, поскольку BLENREP может вызвать изменения зрения

По причине риска возникновения проблем со стороны глаз BLENREP доступен только через ограниченную программу, называемую стратегией оценки и снижения риска (REMS) BLENREP. Ваш лечащий врач выдаст вам руководство для пациента BLENREP REMS, в котором описывается риск возникновения проблем со стороны глаз, и расскажет вам о программе REMS. Чтобы получать BLENREP, вы должны быть включены в программу REMS и проходить обследования глаз во время лечения. См. абзац **«Каковы возможные побочные эффекты BLENREP?»** для получения дополнительной информации о побочных эффектах.

Каковы возможные побочные эффекты BLENREP?

BLENREP может вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе:

- см. абзац **«Проблемы со стороны глаз»** в разделе **«Какую наиболее важную информацию о BLENREP мне следует знать?»**;
- **снижение количества тромбоцитов (тромбоцитопения) часто наблюдается при применении препарата BLENREP и также может быть тяжелым.** Тромбоциты — это тип клеток крови, которые способствуют свертыванию крови. Перед началом лечения препаратом BLENREP и во время лечения по мере необходимости ваш лечащий врач будет проверять количество клеток крови. Сообщите своему лечащему врачу, если во время лечения BLENREP у вас возникнет кровотечение или кровоподтек.

Наиболее частые побочные эффекты BLENREP при совместном применении с бортезомибом и дексаметазоном включают:

- см. абзац **«Проблемы со стороны глаз»** в разделе **«Какую наиболее важную информацию о BLENREP мне следует знать?»**
- инфекция верхних дыхательных путей
- проблемы со стороны печени
- диарея
- усталость
- пневмония
- катаракта
- COVID-19

Наиболее частые тяжелые отклонения от нормы результатов анализов крови во время лечения

BLENREP включают снижение уровня тромбоцитов, лейкоцитов и гемоглобина, а также повышение уровня определенных ферментов печени.

Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если у вас появятся новые или усугубятся необъяснимые признаки или симптомы проблем со стороны легких, включая одышку, боль в груди или кашель.

Если у вас возникнут серьезные побочные эффекты, ваш лечащий врач может снизить дозу, временно прекратить или полностью прекратить лечение препаратом BLENREP.

BLENREP может повлиять на фертильность у мужчин и женщин, что может повлиять на вашу способность иметь детей. Поговорите со своим лечащим врачом, если это вас беспокоит.

Это не все возможные побочные эффекты BLENREP.

Позвоните своему врачу, чтобы получить медицинскую консультацию о побочных эффектах. Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 1-800-FDA-1088.

Перед применением BLENREP сообщите своему лечащему врачу обо всех своих заболеваниях, в том числе, если:

- у вас есть или были проблемы со зрением или глазами;
- у вас есть или были проблемы с кровотечением;
- вы беременны или планируете беременность. BLENREP может нанести вред вашему будущему ребенку.

Женщины, способные забеременеть:

- Перед началом лечения препаратом BLENREP врач проведет анализ на беременность
- Используйте эффективные методы контрацепции во время лечения препаратом BLENREP и в течение 4 месяцев после применения последней дозы. Поговорите со своим лечащим врачом о методах контрацепции, которые вы можете использовать в этом периоде.
- Сообщите своему лечащему врачу, если вы забеременели или подозреваете, что забеременели во время лечения препаратом BLENREP.


Мужчины, партнерши которых способны забеременеть:

- Используйте эффективные методы контрацепции во время лечения препаратом BLENREP и в течение 6 месяцев после применения последней дозы.
- вы кормите грудью или планируете кормить грудью. Неизвестно, проникает ли BLENREP в грудное молоко. Не кормите грудью во время лечения препаратом BLENREP и в течение 3 месяцев после применения последней дозы.

Сообщите своему лечащему врачу обо всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете, включая рецептурные и безрецептурные препараты, витамины и растительные добавки.

Вам рекомендуется сообщать о негативных побочных эффектах рецептурных препаратов в FDA. Посетите веб-сайт www.fda.gov/medwatch или позвоните по телефону 1-800-FDA-1088. Вы также можете сообщить о негативных побочных эффектах в компанию GSK на веб-сайте gsk.public.reportum.com или по телефону 1-888-825-5249.

Нажмите, чтобы увидеть полную инструкцию по применению препарата, включая предупреждение в рамке и руководство для пациентов для препарата BLENREP.



**Если вы не зарегистрировались
в программе Together with
BLENREP, зарегистрируйтесь
сегодня!**



**Щелкните ссылку ниже, чтобы зарегистрироваться и получить
доступ к дополнительным ресурсам, координационной
медсестринской службе* и многому другому.**



Мы всегда готовы помочь!

Вы можете связаться со своей медсестрой-координатором по телефону **1-844-4GSK-ONC**
(1-844-447-5662)

С понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 по
восточному времени или посетите веб-сайт
togetherwithBLENREP.com

*Координационная медсестринская служба не предоставляет медицинских консультаций и не входит в состав лечащего персонала вашего врача. Все вопросы, которые у вас могут возникнуть по поводу вашего заболевания и лечения препаратом BLENREP, задавайте своему врачу.

**Ознакомьтесь с важной информацией по безопасности.
Нажмите, чтобы увидеть полную инструкцию по применению
препарата, включая предупреждение в рамке и руководство для
пациентов для препарата BLENREP.**

**Please see full Prescribing Information, including Boxed Warning
and Medication Guide for BLENREP.**

Торговые марки принадлежат группе компаний GSK или используются ею на основании лицензии.



©2026 GSK or licensor.
PMUS-BLMLBND260021 March 2026
Produced in USA.

Имя файла: Сотрудничество с вашим лечащим персоналом



BLENREP
belantamab
mafodotin-blmf
for injection 70 mg